

4  
[D.] Chinese

Vol. IV.

4



see also

D

1872



素問病機氣宜保命集卷之中

中風論第十

神醫劉守真撰

論曰。經云風者百病之始。善行而數變。行者動也。風本生於熱。以熱為本。以風為標。凡言風者。熱也。叔和云。熱則生風。冷生氣。是以熱則風動。宜以靜勝其躁。是養血也。治須少汗。亦宜少下。多汗則虛其衛。多下則損其榮。汗下各得其宜。然後宜治。在經雖有汗下之戒。而其中臟中腑之說。中腑者。宜汗之。中臟者。宜下之。此雖合汗下。亦不可過也。仲景曰。汗多則亡陽。下多則亡陰。亡陽則損其氣。亡陰則損其形。經曰。氣血者人之神。不可不謹養也。初謂表裏不和。須汗下之。表裏已和。是宜治之。在經也。其中腑者。面如五色。有表證。脉浮而惡風。惡寒。拘急不仁。或中身之後。或中身之前。或中身之側。皆中腑也。其治多易。中臟者。唇吻不收。舌不轉。而失音。鼻不聞香臭。耳聾而眼瞽。大小便秘結。皆曰中臟也。其治多難。經曰。六腑不和。流結為癰。五臟不和。九竅不通。若外無留結。內無不通。必知在經也。初證既定。宜以大藥養之。當順時令。而調陰陽。安臟腑。而和榮衛。察病機。審氣宜。而少有不愈者。若風中腑者。先以加減續命湯。隨證發其表。若忽中臟者。則大便多秘。宜服三化湯。通其滯。表裏證已定。別無他變。故以大藥和治之。大抵中腑者。多着四肢。中臟者。多滯九竅。雖中腑者。多兼中臟之症。至於舌強失音。久服大藥。能自愈也。有中風濕者。夏月多有之。其證身重如山。不能轉側。宜服除濕去熱之藥。治之不可用鍼。可用灸。今具六經續命湯。方小續命湯。通治八風五痺。痿厥等疾。以一歲為總。以六經為別。春夏加石膏。知母。黃芩。秋冬加桂附片藥。又於六經別藥。隨證細分。加減自古名醫。不能越此。

凡覺中風。必先審六經之候。慎勿用大熱藥。為附之類。故陽劑剛勝。積燎原為消。狂瘡腫之屬。則天癸竭而榮涸。是以中風有此誠。故經所謂邪風之至。疾如風雨。易曰。撓萬物者。莫疾乎風。若感之淺。



者留於肌膚感之深者達於骨髓蓋禍患之機藏於細微非常人之豫見及其至也雖智者不能善其後是以聖人之教下皆謂之虛邪賊風避之有時故中風者俱有先見之證凡人如覺大姆指及次指麻木不仁或手足不用或肌肉蠕動者三年內必有大風之至經曰肌肉蠕動命曰微風宜先服八風散愈風湯天麻丸各一料為效故手大指次指手太陰陽明經風多著此經也先服祛風滌熱之劑辛涼之藥治內外之邪是以聖人治未病不治已病又曰善治者治皮毛是止於萌芽也故初成者獲愈固久者伐形是治未病之先也

中風之人如小便不利不可以藥利之既得自汗則津液外亡小便自少若利之使榮衛枯竭無以制火煩熱愈甚當候熱退汗止小便自行也兼此證乃陽明大忌利小便須當識此中風之人能食者凡中風病多能食蓋甲已化土脾盛故能食由是多食則脾氣愈盛上克制腎水水虧則病增據也病宜廣服藥不欲多食病能自愈中風多食者風木也盛則克脾脾受敵求助於食經曰實則夢與虛則夢取是也當瀉肝木治風安脾脾安則食少是其効也中風之人不宜用龍麝犀珠譬之提鈴巡於街使盜者伏而不出益使風邪入於骨髓如油入麵莫能出也此之類焉若痰潮不省昏憤不知人事宜用藥下其痰涎故風者百病之長膚可忽諸

麻黃去節

人參

黃芩各二兩

芍藥

防己

桂枝

川芎各二兩

防風二兩半

附子半兩

杏仁

甘草各兩

右除附子杏仁外搗為麤末後入二味令勻每服五七錢水一盞半生薑五斤煎至一盞去滓稍熱服食前

凡中風不審六經之加減雖治之不能去其邪也內經云開則漸然寒閉則熱而悶知暴中風邪宜先以加減續命湯隨證治之



中風無汗惡寒麻黃續命主之

麻黃

防風

杏仁

依本方添加一倍宜鍼太陽至陰出血崑崙陽蹻

桂枝

芍藥

杏仁

依本方加一倍宜鍼風府以上二證皆太陽經中風也

中風無汗身熱不惡寒白虎續命主之

石膏

知母

一料中各加二兩

甘草

依本方加一倍

中風有汗身熱不惡風葛根續命主之

葛根

桂枝

黃芩

依本方加一倍

宜鍼陷谷刺厲兌鍼陷谷者去陽明之賊刺厲兌者瀉陽明經之寔也以上二證陽明經中風也

中風無汗身涼附子續命主之

附子

加倍乾薑加二兩

甘草

加三兩

宜刺隱白穴去太陰之賊也此一證太陰經中風也

中風有汗無熱桂枝續命主之

桂枝

附子

甘草

依本方加一倍

右六鍼太谿此證少陰經中風也

中風六證混淆繫之於少陽厥陰或肢節痠痛或麻木不知西羌活連翹續命主之

小續命

八兩加羌活四兩連翹六兩

考之續命混淆無六證之別今各分經治療又分經鍼刺恰厥陰之井大敦刺以通其經少陽之經



絕骨灸以引其熱是鍼灸同象法治之大體也

中風外無六經之形證內無便溺之阻格知血弱不能養筋故手足不能運動舌強不能言語宜養血而筋自榮大秦羌湯主之

秦羌 三兩

甘草 二兩

川芎 三兩

當歸 二兩

白芍藥 二兩

細辛 半兩

川羌活

防風

黃芩 各兩

石膏 二兩

吳白芷 二兩

白朮 二兩

生地黄 二兩

熟乾地黄 二兩

白茯苓 二兩

川獨活 二兩

右一十六味剉每服一兩水煎去滓溫服無時如遇天陰加生薑煎如心下痞每兩加楮實一錢同煎

中風外有六經之形證先以加減續命湯隨證治之內有便溺之阻格復以三化湯主之

厚朴

大黃

枳實

羌活 各等分

右剉如麻豆大每服三兩水三升煎至一升半終日服之以微利為度無時法曰四肢不舉俗曰

癱瘓故經所謂太過則令人四肢不舉又曰土太過則敦阜阜高求敦厚也既厚而又高則令除去此真所謂膏粱之疾非肝腎經虛何以明之經所謂三陽三陰發病為偏枯痿易四肢不舉王注曰三陰不足則發偏枯三陽有餘則痿易二為變易常用而痿弱無力也其治則瀉令氣弱陽衰土平而愈或三化湯調胃承氣湯選而用之若脾虛則不用也經所謂土不及則卑陷卑下也陷坑也故脾病四肢不用四肢皆稟氣於胃而不能至經必因於脾乃不得稟受也令脾不能與胃行其津液四肢不得稟水穀氣日以衰脉道不利筋骨肌肉皆無氣以生故不用焉其治可補十全散加減四物去邪留正

愈風湯中風證內邪正除外邪已盡當服此藥以行導諸經久服大風悉去縱有微邪只從此藥加減治之然治病之法不可失其通塞或一氣之微汗或一旬之通利如此為常治之法也久則清濁



自分榮衛自和如此初覺風動服此不致倒仆

羌活

甘草

防風

蔓荊子

川芎

細辛

枳殼

人參

麻黃

甘菊

薄荷

枸杞

當頭

知母

地骨皮

黃耆

獨活

杜仲

吳白芷

秦艽

柴胡

半夏

前胡

厚朴

熟地黃

防已各二兩

茯苓

黃芩各兩

石膏四兩

芍藥三兩

蒼朮

生地黃各四兩

桂一兩

以上三三味

通七十三兩

右剉每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服如遇天陰如生薑煎空心一服臨卧再煎藥滓服俱要食遠服空心一服喫下二升丸為之重劑臨卧一服喫下四升丹為之輕劑動以安神靜以清肺假令一氣之微汗用愈風湯三兩麻黃一兩均作四服一服如生薑五片空心服以粥投之得微汗則佳如一旬之通利用愈風三兩大黃一兩亦均作四服如前煎臨卧服得利則妙常服之藥不可失四時之轉如望春大寒之後加半夏二兩通四兩柴胡二兩通四兩人參二兩通四兩謂迎而奪少陽之氣也望夏之月半加石膏二兩通六兩黃芩二兩通五兩知母二兩通四兩謂迎而奪陽明之氣也望秋之月加防已二兩通四兩白朮二兩茯苓二兩通五兩謂勝脾土之濕也初秋大暑之後加厚朴二兩通四兩藿香二兩桂一兩通二兩謂迎而奪太陰之氣也霜降後望冬加附子一兩桂一兩通二兩當歸二兩通四兩謂勝少陰之氣也得春減冬四時類此雖立法於四時之加減更宜臨病之際審病之虛實寒熱寒土地之宜和氣之多少此藥具七情六慾四氣無使五臟偏勝及不動於榮衛如風秘服之則永不燥結如火瀉服之則能自調初覺風氣便能服此藥及新方中天麻丸各一料相為表裏治未病之勝藥也及已病者更宜常服無問男子婦人及小兒驚癇搐急慢驚風等病服之神効如解利四時傷風隨四時加減法又療脾腎虛弱惡訖言難精神昏憤及治內弱風濕內弱者乃風熱火光體為芳風濕土餘內弱之為病或一臂



肢體偏枯。或肥而半身不隨。或恐而健忘。喜以多思。故思忘之道。皆情不足。衛是以心亂則百病生。於心靜則萬病悉去。故此藥能安心養神。調陰陽。無偏勝。及不動榮衛。

四白丹能消肺氣。養魄謂中風者多昏。胃氣不清利也。

白木半兩

白芷一兩

白茯苓半兩

白檀一錢半

人參半兩

知母二錢

縮砂仁半兩

羌活一錢半

獨活二錢半

防風

川芎各五錢

細辛二錢

甘草五錢

甜竹葉二兩

香附子五錢

龍腦半錢

麝香一錢半

牛黃半錢

藿香一錢半

右并二十味計八兩六錢三字為細末。煉蜜為丸。每兩作十九丸。臨卧嚼一丸。分五七次嚼之。上清肺氣下強骨髓。

二丹丸

治健忘養神定志。和血內安心神。外華腠理。

月參二兩半

丹砂五錢

遠志半兩

茯神一兩

人參五錢

菖蒲五錢

天門冬二兩半

麥門冬一兩

甘草一兩

人參五錢

菖蒲五錢

熟地黃二兩半

右為細末。煉蜜為丸。如桐子。大每服五十丸。至一百丸。空心食前常服。安神定志。一藥清肺。一藥安神。故清中清者。歸肺以助天真。清中濁者。堅強骨髓。血中之清。榮養子神。血中之濁。華榮腠理。如素有痰。久病中風。津液湧溢在胸中。氣所不利用。獨聖散吐之。後用利氣瀉火之劑。本方在後。

瀉青丸

治中風自汗。昏冒發熱。不惡寒。不能安卧。此是風熱煩燥。

當歸

龍膽

川芎

梔子

羌活

大黃

防風各等分

右為細末。煉蜜為丸。如彈子。大每服一丸。竹葉湯化下。

天麻丸

係新方中

天麻六兩

酒浸三

牛膝六兩

同杜仲

草解六兩

剉研

玄參六兩

當歸十兩

生地黃十六兩

羌活十兩

附子一兩

附子一兩



右為細末。練蜜為丸。如桐子大。常服五七十丸。病大至百丸。空心食前。溫酒。或白湯下。平明服藥。至日高。饑則止服藥。大忌雍塞。失于通利。故服藥半月。稍覺壅微。以七宣丸輕疎之。使藥再為用。也。牛膝草。蘇治筋骨。杜仲使筋骨相着。天麻羌活和風之勝藥。當歸地黃養血能和榮衛。玄參主用。附子佐之行經也。

獨聖散 治諸風隔疾。諸癰痰涎。津液湧溢。雜病亦然。

瓜蒂 一兩

右判如麻豆大。燥令黃色。為細末。每服量虛實。久新或三錢。藥末茶一錢。酸薑汁一盞。調下。若用吐法。天氣清明陰晦無用。如病卒暴者。不拘于此法。吐時辰午巳前。故內經曰。平旦至日中。天之陽。陽中之陽也。論四時之氣。仲景曰。大法春宜吐。是天氣在上。人氣亦在上。一日之氣。卯辰之寅。候也。故宜早。不宜夜也。先令病人隔夜不食。服藥不吐。再用熱薑水投之。如吐風癰病者。加全蝎半錢。微炒。知有虫者。加狗油五七點。雄黃末一錢。甚者加羌花末半錢。立吐其虫。如濕腫滿者。加赤小豆末一錢。故此不可常用。大要辨其虛實。是則瓜蒂散虛則梔子豉湯。滿加厚朴。不可一概用之。吐罷可服降火順氣安神定志之劑。

治風癰病不能愈者。從厚朴。尤宜春秋加添外。又于每一料中。加

人參 葛蒲

茯苓 去本各一兩半

右依厚朴丸春秋加添法。和劑服餌。厚朴丸方在吐論中。

防風通聖散

防風

川芎

當歸

芍藥

大黃

芒硝

連翹

薄荷

麻黃 各半兩 不祛節

石膏

桔梗

黃芩 各兩

白朮

山梔子

荊芥穗 各半兩 滑石 三兩

甘草 二兩



右為麝末。每服一兩。生薑同煎。溫服。日再服。勞汗當風。汗出為酸。鬱乃座勞。汗出于玄府。脂液所凝。去芒硝。倍加芍藥。當歸。發散玄府之風。當調其榮衛。俗云風刺。或生癰瘡。或赤或白。倍加麻黃。鹽豉。葱白。出其汗。麻黃去節。亦去芒硝。鹹走血。而內凝。故不能發汗。罷依前方中。加四物湯。黃連解毒。三藥合而飲之。日二服。故內經曰。以苦發之。謂熱在肌。表連內也。小便淋瀝。去麻黃。加滑石。連翹。煎藥湯。調木香末二錢。七麻黃主表。不主于裏。故去之。腰脇痛走症。痛者加硝石。當歸甘草。一服各二錢。調車前子末。海金沙末。各二錢。內經曰。腰者腎之府。破傷風者。如在表。則卒以散之。在裏。則苦以下之。兼散之。汗下後。通利血氣。祛逐風邪。每一兩內。加荊芥穗。大黃各二錢。調全蠍末一錢。羌活末一錢。諸風潮搐。小兒急慢驚風。大便結秘。邪熱暴甚。腸胃乾燥。寢汗咬牙。上竅睡語。筋轉驚悸。肌肉蠕動。每一兩加大黃二錢。梔子二錢。調茯苓末二錢。如肌肉蠕動者。調羌活末一錢。故經曰。肌肉蠕動。命曰微風。風傷于肺。故嗽喘急。每一兩加半夏。桔梗。紫苑各一錢。如打撲傷損。支節疼痛。腹中惡血不下。每一兩加當歸。大黃各三錢。半調沒藥。乳香末。各二錢。解利四時傷寒。內外所傷。每一兩內。加益元散一兩。葱白十莖。鹽豉一合。生薑半兩。水一椀。同煎至五七沸。或煎一小椀。溫冷服。一半以筋探之。即吐罷。後服一半。稍熱。服汗出立解。如飲酒中風。身熱頭痛。如破者。加黃連。鬚二錢。葱白十莖。依法立愈。慎勿用桂枝。麻黃湯解之。頭旋腦熱。鼻塞濁涕。時下。每一兩加薄荷。黃連各二錢。半。內經曰。膽後熱于腦。則辛頰鼻淵。鼻淵者。濁涕下不已也。王注曰。膽液下滲。則為濁涕。下不已。如泉水。故曰鼻淵也。此為足太陽脉。與陽明脉俱盛也。故氣逆者。調木香末一錢。

### 癰風論第十一

內經曰。癰風者。有榮氣熱。附其氣不清。故使鼻柱壞。而色敗。皮膚癰潰。故先風寒客于脉。而不去。名曰癰風。又曰。脉風成為癰。俗云癰病也。故治法云。大風骨節重。鬚眉墮。名曰大風。刺肌肉病。故汗出。



百日王注曰泄衛氣之怫熱刺骨髓汗出百日泄榮氣之怫熱凡二百日鬚眉生而止鍼怫熱屏退陰氣內復故多汗出鬚眉生也先樺皮散從少至多服五七日後灸承漿穴七壯灸瘡輕再灸瘡愈再灸後服二聖散泄熱祛血之風邪戒房室三年鍼灸藥止述類象形此治肺風之法也然非止肺藏有之俗云鼻屬肺而病發于肺端而言之不然如此者慨鼻准腫赤脹但為瘡之類乃謂血隨氣化既氣不施化則血聚矣然血既聚使肉腐爛而生虫也謂厥陰主生五虫厥陰為風木故木主生五虫蓋三焦相火熱甚而制金金衰故木來尅侮經曰侮勝也宜瀉火熱利氣之劑虫自不生也法云流水不腐戶樞不蠹此之類也故此疾血熱明矣當以藥緩疎泄之煎局方內外升麻湯下徐氏內瀉青丸餘各隨經言之故病風者陽氣先受傷也

樺皮散

治肺藏風毒

遍身瘡疥及癰疹瘙痒搔之成瘡又治面風刺及婦人粉刺

樺皮

燒灰

荆芥穗

二兩

甘草

半兩

炙杏仁

二兩

去皮尖用水一

半已後收放合乾

枳殼

四兩

去穢用炭火燒令

灰于溫紙上令合

右件除杏仁外餘藥為末將杏仁別研合細次用諸藥合勻磁合內放之服每三錢食後溫酒調下

二聖散

治大風癰疾

大黃

半兩

皂角刺

三錢

燒灰

右將皂角刺一二斤燒灰研細煎大黃半兩湯調下二錢早服樺皮散中煎升麻湯下瀉青丸晚服二聖散此數等之藥皆為緩疎泄血中之風熱也

七聖丸

局方中

七宣丸

局方中

皆治風壅邪熱

潤利大腸

中風風癰風痛

大便秘澁

皆可服之

此方

局方中治法曰雖柯子味苦澁而能止臟腑此利藥中用柯子合大黃枳殼緩緩而推陳泄去邪氣

若年老風秘澁者乃津液內亡也故不可用峻劑攻之內經曰年四十而氣自半也起居衰矣年五



保命集

卷中

五

十體重耳目不聰明矣年六十陰痿氣大衰九竅不利下虛上寒涕淚出矣故曰知之則強不知則老舉世皆言年老之人無熱俱虛豈不明年四十而陰氣自半故陰虛陽盛明矣是以陰盛其下陽盛其上故上實下虛此理明矣

破傷風論第十二

論曰夫風者百病之始也清淨則腠理閉拒雖有大風苛毒而并能為害也故破傷風者通于表裡分別陰陽同傷寒證治開闢往往有不知者只知有發表者不知有攻裏者和解者此汗下和三法也亦同傷寒證有在表者有在裏者有半在表半在裏者在裏宜下在表宜發汗在表裏之間宜和解然汗下亦不可過其法也又不可妄意處治各通其臟脉免汗泄之非宜也故破傷風者從外至內甚於內者則病也因此卒暴傷損風襲之開傳播經絡至使寒熱更作身體反強口噤不開甚者邪氣入臟則分汗下之治諸瘡不瘥榮衛虛腠肉不生瘡眼不合者風邪亦能外入於瘡為破傷風之候故諸瘡不瘥時舉世皆言着灸為上是謂熟瘡而不知火熱客毒遂諸經變不可勝數微則發熱甚則生風而搐或角弓反張口噤目斜皆因瘡鬱結於榮衛不得宣通而生亦有破傷不灸而病此者瘡着白痴瘡口閉塞氣難通泄故陽熱易為鬱結而熱甚則生風也故表脉浮而無力太陽也脉長而有力者陽明也脉浮而弦小者少陽也大陽宜汗陽明宜下少陽宜和解若明此三法而治不中病者未之有也

羌活防風湯 治破傷風邪初傳在表

羌活

防風

川芎

梔本

當歸

芍藥

甘草 各二兩

地榆

華細辛 各二兩

右咬咀每服五錢水一盞半同煎至七分去滓熱服不拘時候量緊慢加減用之熱則加大黃二兩大便秘則加大黃一兩緩緩令過



白木防風湯 若服前表藥過有自汗者宜服此藥

白木一兩 防風二兩 黃耆一兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服不拘時候臟腑和而有自汗可用此藥破傷風臟腑秘小便赤自汗不止者因用熱藥汗出不休故知無寒也宜速下之先用芎黃湯三二服後用大芎黃湯下之

芎黃湯

川芎一兩 黃芩六錢 甘草二錢

右咬咀每服五錢水一盞半同煎至七分去滓溫服不拘時候三服即止再用下藥大芎黃湯

川芎一錢 羌活 黃芩 大黃各一兩

右咬咀依前煎服宜和為度

發表雄黃散

雄黃一錢 防風二錢 草烏一錢

右件為細末每服一字溫酒調下裏和至愈可服裏和不可服

蜈蚣散

蜈蚣一對 鱉五錢 左蟠龍五錢炒煙盡為度野雞是也

右件為細末每服一錢清酒調下治法依前用裏和至愈可服但有裏證不可服次當下之用前蜈蚣散四錢巴豆霜半錢燒蝕為丸如菜豆大每服一丸漸加六七丸清酒調蜈蚣散少許送下宣利為度內外風去可常服羌活湯緩緩而治不拘時候服之羌活湯者治半在表半在裏也

羌活湯



羌活

菊花

麻黃

川芎

石膏

防風

前胡

黃芩

細辛

甘草

枳殼

白茯苓

蔓荊子 已上各一兩

薄荷半兩

吳白芷半兩

防風湯

治破傷風同傷寒表證未傳入裏宜急服此藥

防風

羌活

獨活

川芎 各等分

蜈蚣散

右咬咀每服五錢水一盞半煎至七分去滓溫服三二服後宜調蜈蚣散大效

蜈蚣一對

鯽三錢

右為細末用防風湯調下如前藥解表不已覺轉入裏當服左龍丸漸漸看大便硬軟加巴豆霜服之

左龍丸

左蟠龍五錢

白殭蠶五錢

鯽半兩

雄黃一錢

右同為細末燒蝕為丸如桐子大每服十五丸溫酒下如裏證不已當于左龍丸末一半內入巴豆霜半錢燒蝕為丸如桐子大每服一丸同左龍丸一處合服每服藥中加一丸如此漸加服至利為度若利後更服後藥若攝症不已亦宜服後藥羌活湯也

羌活湯

羌活

獨活

防風

地榆各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服如有熱加黃芩有涎加半夏若病日久氣血漸虛邪氣入胃全養血為度



養血當歸地黃散

當歸

地黃

芍藥

川芎

藁本

防風

白芷各一兩

細辛五錢

右咬咀依前煎服

雄黃散

治表藥

天南星三錢

半夏五錢

天麻五錢

雄黃二錢半

右為細末

每服一錢溫酒調下如有涎于此藥中加大黃為下藥

地榆防風散

治破傷風中風半在表半在裡頭微汗身無汗不可發汗宜表裏治之

地榆

防風

地丁香

馬齒莧各等分

右件為細末每服三錢溫米飲調下

白朮湯

治破傷風大汗不止筋攣搐搦

白朮

葛根各兩

升麻

黃芩各半兩

芍藥二兩

甘草二錢半

右咬咀每服一兩水一盞半煎至一盞去滓溫服不拘時候

江鱉丸

治破傷風驚而發搐臟腑秘澀知病在裏可用江鱉丸下之

江鱉

治破傷風驚而發搐臟腑秘澀知病在裏可用江鱉丸下之

雄黃一錢

白僵蠶半兩

蜈蚣一對

天麻一兩

右件為細末又將藥末作三分用二分燒蝕為丸如桐子大硃砂為衣後將一分入巴豆霜一錢

同和亦以燒蝕為丸如桐子大不用硃砂衣每服硃砂為衣丸二十九入巴豆霜一丸第二服二

丸加至利為度再服硃砂為衣藥病愈止

沒藥散

刀箭藥止血住痛

定粉一兩

風化灰一兩

枯白礬三錢

乳香半兩

沒藥一兩



保命集

卷中

右件各研為細末同和勻再研搗之

解利傷寒論第十三

論曰傷寒之法先言表裏及有緩急。三陽表當急裏當緩。三陰表當緩裏當急。又曰脉浮當汗脉沉當下。脉浮汗急而下。緩謂三陽表也。脉沉下急而汗。緩謂三陰裏也。麻黃湯謂之急。麻黃附子細辛湯謂之緩。內經云有漬形以為汗為汗之緩裏之表也。又云在皮者汗而發之為汗之急。表之表也。急汗者太陽緩汗者少陰是臟腑之輸應也。假令麻黃附子細辛湯是少陰證始得發熱脉沉裏和無汗故漬形以為汗假令麻黃湯是太陽證頭項痛腰脊強脉浮無汗裏和是也在皮者汗而發之也。經曰治主以緩治客以急此之謂也。

麻黃湯

麻黃去節

桂枝三錢

甘草二錢

杏仁去皮尖炒

右以咀都作一服水煎去滓溫服

假令得肝脉其外證喜潔面青善怒其三部脉俱弦而浮惡寒裏和謂清便麻黃湯內加羌活防風

各三錢謂肝主風是膽經受病大便秘或泄下赤水無數皆裏不和也。假令得心脉其外證面赤

口乾善笑其尺寸脉俱浮而洪惡寒裏和謂清便麻黃湯內加黃芩石膏各三錢謂主心熱是小腸

受病也。假令得脾脉其外證面黃善噦思善味尺寸脉俱浮而緩裏和惡寒麻黃湯內加白朮

防已各五錢謂脾主濕是胃經受病也。假令得肺脉其外證面白善嚏悲愁不樂欲哭其尺寸脉

俱浮而溢裏和惡寒麻黃湯內加桂枝生薑各三錢謂肺主燥是大腸受病也。假令得腎脉其外

證面黑善恐顯其尺寸脉俱浮而裏和惡寒麻黃湯加附子生薑謂腎主寒是膀胱受病也。

已上各五證皆表之表謂在皮者急汗而發之也皆腑受病表之裏者下之當緩謂隨臟表證外顯

尺寸脉俱浮而復有裏證謂發熱飲水便利赤溢或泄下赤水按之內實或痛麻黃湯去麻黃杏仁



與隨臟元加藥同煎作五服每下一證初一服加大黃半錢邪盡則止未盡第二服加大黃一錢邪未盡第三服加大黃一錢半如邪未盡又加之邪盡則止此謂先緩而後急是表之裏證下之當緩也麻黃附子細辛湯

麻黃半兩去

細辛半兩去

附子一錢一分半炮

右以咀都作一服水煎去滓溫服

假令得肝脉其內證滿閉淋瀝便難轉筋其尺寸脉俱沉而弦裏和惡寒肝經受病麻黃附子細辛

內加羌活防風各三錢假令得心脉其內證煩心心痛掌中熱而喘其尺寸脉俱沉裏和惡寒心

經受病加黃芩石膏各二錢假令得脾脉其內證腹脹滿食不消急墮嗜卧其尺寸脉俱沉裏和

惡寒脾經受病如白木防已各三錢假令得肺脉其內證喘咳洒淅寒熱其尺寸脉俱沉裏和惡

寒肺經受病加生薑桂各三錢假令得腎脉其內證泄如下重足脛寒而逆其尺寸脉俱沉裏和

惡寒腎經受病更加附子生薑各三錢已主五證裏之表也宜漬形以為汗皆臟受病也裏之裏者下之當急謂隨臟內證以顯尺寸脉俱

沉復有裏證者謂大小便秘澀或泄下赤水或泄無數不能飲食不惡風寒發熱引飲其脉俱沉或

按之內寔而痛此謂裏寔宜速下之麻黃附子細辛內麻黃與隨臟元加藥內分作三服每下一證

初一服加大黃三錢邪盡則止如邪未盡其一服加大黃二錢又未盡第三服加大黃一錢此先急

而後緩謂裏之裏也當速下之也通解利傷寒不問何經之受皆能混然解之謂不犯各經之受病雖不解盡亦無壞證

羌活湯

羌活 二兩

防風 一兩

川芎 一兩

黃芩 一兩

細辛 二錢半

甘草 一兩

黑地黃 一兩

白朮

二兩如用者加一兩



右以咀每服五七錢水二盞煎至一盞無時溫服清如覺發熱引飲如黃芩甘草各一兩更隨證如頭痛惡風于白朮湯一兩內加羌活散三錢都作一服

羌活一兩半 川芎七錢 細辛根二錢半

如身熱依前加石膏湯四錢

石膏湯

石膏二兩 知母半兩 白芷七錢

如腹中痛者加芍藥散三錢

芍藥散

芍藥二兩 桂五錢

如往來寒熱而嘔加柴胡散二錢

柴胡散

柴胡根一兩 半夏五錢洗

如生薑煎如心下痞加枳實一錢如有裏證加大黃初一服一錢次二錢又三錢邪盡則止

論曰有汗不得服麻黃無汗不得服桂枝然春夏汗孔疎雖有汗不當用桂枝宜用黃耆湯和解

冬汗孔閉雖無汗不當用麻黃宜用川芎湯和解春夏有汗脈乃微而弱惡風惡寒者乃太陽證秋

冬之脈也亦宜黃耆湯無汗亦宜川芎湯秋冬有汗脈盛而浮發熱身熱者乃陽明證春夏之脈也

亦宜黃耆湯無汗亦宜川芎湯大抵有汗者皆可用黃耆湯無汗者亦可用川芎湯

黃耆湯有汗則止也

黃耆 白朮 防風各等分



右吹咀每服五七錢。至十餘錢。或半兩。一兩。水煎溫服。清汗多。惡風甚者。加桂枝。川芎湯。無汗則發也。

川芎

白朮

羌活 各等分

右吹咀同黃耆湯稍熱服。惡寒甚。則及脉大浮。半加麻黃。法云五臟之脉寸關尺也。今止言尺寸。陰陽也。如陽緩而陰急。表和而裏病。陰緩而陽急。裏和而表病也。若傷寒食少發渴。只可和胃止渴。不可太涼藥止之。然惡涼藥止之。損着胃氣。必不能食也。和胃白朮湯。

白朮

茯苓

起卧不能謂之濕身重是也。小柴胡湯。黃芩芍藥湯。起卧不安。眠睡不穩。謂之煩。梔豉湯。竹葉石膏湯。解利四時傷寒。混解六經。不犯禁忌。大白朮湯。

白朮 二兩

防風 一兩

羌活 一兩

川芎 一兩

黃芩 五錢

細辛 三錢

白芷 二兩半

石膏 二兩

知母 七錢

甘草 五錢

枳實 去穢五錢

右為籠末。每服半兩。水一盞半。煎至一盞。大溫服。清未解。更一服。兩服藥滓。又作一服。春倍防風。羌活。夏倍黃芩。知母。季夏雨注倍白朮。白芷。秋加桂。五錢。冬桂八錢。或一兩。立夏之後。至立秋處。暑之間。傷寒者。身多微涼。微有自汗。四肢沉重。謂之濕溫。又謂之濕淫。宜蒼朮石膏湯。

蒼朮 石膏湯

石膏末 五錢

知母 七錢

甘草 一錢

右同和勻。都作一服。水兩盞。煎至一盞。溫服清胃。內有溫熱也。多不欲飲水。如身熱脉洪。無汗多。渴者。是熱在上焦。積于胸中。宜桔梗散。



桔梗散

薄荷一錢 黃芩一錢 甘草一錢 桔梗半兩 連翹二錢 山枝子仁一錢

右剉每服五錢或七錢 秤半兩水煎加竹葉如大便秘結加大黃半錢

熱論第十五

論曰有表而熱者謂之表熱也無表而熱者謂之裏熱也有暴發而為熱者乃表不宣通而致也有服溫藥過劑而為熱者有惡寒戰慄而熱者蓋諸熱之屬者心火之象也王注曰百端之起皆自心生是以上善若水下愚若火治法曰小熱之氣涼以和之大熱之氣寒以去之甚熱之氣則汗發之六腑六腑屬陽而在外故內者下之外者發之又宜養血益陰其熱自愈此所謂不治而治也故不治謂之常治治而不治謂之暴治經所謂諸寒而熱者取之陰諸熱而寒者取之陽此所謂求其屬也王注曰益火之源以消陰翳用水之主以制陽光此之謂也

病有暴熱者病在心肺有積熱者病在腎肝暴熱者宜局方中雄黃解毒丸積熱者局方中妙香丸暴熱上喘者病在肺肺謂之高喘木香金鈴子散上焦熱而煩者牛黃散臟腑秘者大黃牽牛散上焦熱無他證者桔梗湯有虛熱不能食而熱者脾虛也宜以厚朴白朮陳皮之類治之有寒熱能食而熱者胃寔也宜以梔子黃芩湯或三黃丸之類治之蔚金柴胡之類亦是也有病久難悴發盜汗謂五臟齊損此熱勞骨蒸病也瘦弱虛煩腸癖下血皆葉勞也宜養血益陰熱能自退當歸生地黃或錢氏地黃丸是也

木香金鈴子散 治暴熱心肺上喘不已

大黃半兩 金鈴子三錢 木香三錢 輕粉少許 朴硝一錢

右為細末柳白皮湯調下三錢或四錢食後服以利為度喘止即止



牛黃散 治上焦熱而煩不能睡卧

梔子 半兩 大黃 半兩 鬱金 半兩 甘草 二錢半

右為細末。每服五錢。水煎溫服。食後微利。則已。

大黃牽牛散 治相火之氣。遊走臟腑。大便秘結。

大黃 二兩 牽牛 頭末五錢

右為細末。每服三錢。有厥冷。用酒調三錢。無厥冷。而手足煩熱者。蜜湯調下。食後微利為度。此謂不時而熱者。濕熱也。

地黃丸 治久新憔悴。寢汗發熱。五臟齊損。瘦弱虛煩。腸癖下血。骨蒸痿弱無力。不能運動。

熟地黃 一兩 山茱萸 四錢 乾山藥 四錢 牡丹皮 白茯苓 澤瀉 各三錢

右為細末。煉蜜為丸。桐子大。每服五十丸。空心溫酒送下。

防風當歸飲子 如煩渴。皮膚索澤。食後煎服。防風飲子。

空心服地黃丸。

柴胡 人參 黃芩 甘草 各二兩 大黃 當歸 芍藥 各半兩

滑石 三兩

右為麤末。每服五錢。水一盞半。吐薑三斤。同煎至七分。去滓溫服。如痰寔欬嗽。加半夏。如大便黃。

米穀完出。驚悸弱血淋瀝。欬血衄血。自汗頭痛。積熱肺痿。後服大金花丸。

大金花丸

黃連 黃柏 黃芩 山梔子 各一兩

右為細末。滴水為丸。如小豆大。每服一百丸。溫水下。日二三服。或大便秘寔。加大黃。自利不用大黃。如中外有熱者。此藥作散。剉服。名解毒湯。或腹滿嘔吐。欲作利者。每服半兩。解毒湯中。加半夏。茯苓。



荅厚朴各三錢生薑三片如白朮下痢後重者加大黃三錢  
涼膈散 加減付于後

連翹

山梔子

大黃

薄荷葉 各半兩

黃芩 半兩

甘草 一兩半

朴硝 二錢半

右件為處末每服半兩水一盞半煎至一盞去滓入蜜一匙微煎溫服食後咽噎不利腫痛并  
涎嗽者加桔梗一兩荊芥穗半兩效而嘔者如半夏二錢半生薑煎鼻衄嘔血者加當歸芍  
藥生地黃各半兩一料內有淋悶者如滑石四兩茯苓一兩或悶而不通臍下形如復碗痛悶  
不可忍者乃腸胃乾涸腹中氣不下故經文曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣故腹  
中者臣使之官名三焦相火下合右腎為氣海也王注曰膀胱津液之府胞內居之小腹處間  
毛內藏胞氣者得氣海之氣施化則溲便注下氣海氣之不及則滯而不通故不得便利也先用  
木香沉香各三錢酒調下或入正散甚則宜上湧之合氣通達小便自通經所謂病在下上取之  
王注曰熱攻于上不利于下氣盛於上溫辛以散之苦以利之  
當歸承氣湯

當歸

大黃 各兩

甘草 半兩

芒硝 九錢

右為丸綠豆大每服二兩水一大碗入生薑五片棗十枚水煎至半碗去滓熱服若陽狂奔走罵  
詈不避親疎是陽有餘陰不足大黃芒硝去胃中實當歸補血益陰甘草和中如生薑棗胃屬土  
此引至于胃中也經所謂微者逆之甚者從之此之謂也以大利為度微緩以瓜蒂散加防風藥  
蘆吐其病立愈後調法洗心散涼膈散解毒湯等藥調治之  
治熱入血室發狂不認人牛黃膏

牛黃 二錢半

朱砂 三錢

腦子 一錢

麝香 三錢

甘草 一錢

牡丹皮 三錢



石為細末煉蜜為丸如皂子大新水化下。

治暴熱者局方中雄黃解毒丸

治久熱者局方中妙香丸

治虛勞骨蒸煩熱下血者錢氏地黃丸

治虛熱不能食者脾虛也宜以厚朴白朮陳皮之類治之

治寔熱能食者胃寔也宜以梔子黃芩或三黃之類丸治之

治表熱惡寒而渴白虎湯也

膚如火燎而熱以手取

之不甚熱為肺熱也目白睛赤煩躁或引飲獨黃芩一味主之水煎或兩脇下肌熱脉浮弦者柴胡飲子主之兩脇肋熱或一身盡熱者或日晡熱者皆為血熱也四順飲子主之夜發熱主行陰乃

血熱也四順桃仁承氣選用當視其腹痛血刺痛與有表裏腹中轉失氣燥結之異晝則明了夜則譫語四順飲子證與桃仁承氣相似不可不辨也發熱雖無脇熱亦為柴胡證晝則行陽二十五

度氣藥也大抵則柴胡夜則行陰二十五度血藥也大抵四順飲子

### 內傷論第十五

論曰人之生也由五穀之精化五味之備故能生形經曰味歸形若傷于味亦能損形合飲食反過其節腸胃不能勝氣不及化故傷焉經曰壯火食氣氣食少壯火散氣少壯火生氣痺論曰飲食自倍腸胃乃傷或失四時之調養故能為人之病也經曰氣口緊而傷于食心脹滿而口無味與氣口同氣口者乃脾之外候故脾胃傷則氣口緊盛夫傷者有多少有輕重如氣口一盛脉得六至則傷於厥陰乃傷之輕也積柳丸主之氣口二盛脉得七至則傷于少陰乃傷之重也煮黃丸厚朴丸主之氣口三盛脉得八至則傷于太陰積塞悶亂甚則心胃大痛兀兀欲吐得吐則已俗呼食迷國是也經曰上部有脉下部無脉其人當吐不吐則死宜吐之以瓜蒂散如不能則無治也經曰高者因而越之下者引而竭之是也

積柳丸

積柳二錢半

陳皮去白兩

木香二錢半

牽牛頭末半兩



有為細末醋糊為丸如桐子大每服十五丸至二十丸米飲下生薑湯亦可

煮黃丸

雄黃一名兩 巴豆五錢生用去殼

右二味再研入白麵二兩同再和研勻滴水為丸如桐子大每服時先煎漿水冷沸下藥二十四丸煮三十沸撈入冷漿水中沉米冷一時下一丸一日二十加至微利為度用浸藥水送下此藥腸下症癖痛如神

瓜蒂散

瓜蒂三錢 赤小豆三錢

右為細末溫水調一錢以吐為度如傷之太重備急丸獨行丸皆急藥也

金露丸

治天行時疫內傷飲食心下痞悶  
大黃二兩 枳實炒五錢 牽牛頭末二兩 桔梗二兩

右同為細末燒飲為丸如桐子大每服三五丸食後溫水下如常服十丸二十丸甚妙  
治氣不下降食難消 常服進食遂飲

枳寔丸

枳寔錢抄五錢 白朮二兩剉

右為細末燒飲為丸如桐子大每服五十丸米飲下

治飲食不化心腹膨悶積柳丸主之如甚則脇肋虛脹煮黃丸主之治氣不下降飲食難消金露丸主之

諸瘧諸論第十六

經曰夏傷于暑秋必病瘧蓋傷之淺者近而暴發傷之重者遠而痼瘧痼者久瘧也是知夏傷于暑



溫熱閉藏而不能發泄于外邪氣內行至秋而發為瘧也初不知何經受之隨其動而取之有中三陽經者謂之風瘧治多汗之在陽明經者謂之熱瘧治多下之在少陽經者謂風熱瘧治多和之此三陽受病皆謂之暴瘧發在夏至後處暑前此乃傷之淺者近而暴也在陰經則不分三經總謂之溫瘧當從太陰經論之其病發在處暑後冬至前此乃傷之重者遠而為瘧瘧者老也故謂之久瘧氣居西方宜毒藥療之瘧之為病因內積暑熱之氣不能宣泄于外而為瘧也當盛夏之時能食寒涼之物而助陰氣者後使有暑熱之氣微者自消矣寒時復以藥疎利臟腑使邪氣自下內經曰春食涼夏食寒秋食溫冬食熱是謂春夏養陽秋冬養陰人能于飲食起居之間順四時之氣而行之邪氣何由得生也

治瘧病處暑前頭痛項強脉浮惡寒有汗桂枝羌活湯

桂枝

羌活

防風

甘草

炙各半兩

右為粗末每服半兩水一盞半煎至一盞溫服清迎發而服之如吐者加半夏麴等分

治瘧病頭痛項強脉浮惡風無汗者麻黃羌活湯

麻黃

去節

羌活

甘草

炙各半兩

同前服如吐者加半夏麴等分

治瘧法如前證而夜發者麻黃桂枝湯主之

麻黃

一兩

去節

甘草

炙三錢

桃仁

三十個

黃芩

五錢

右五味同為細末依前服桃仁味苦甘辛肝者血之海血聚則肝氣燥經所謂肝苦急急食甘者

以緩之故桃仁散血緩肝謂邪氣深遠而入血故夜發乃陰經有邪此湯發散血中風寒之劑

治瘧病身熱目痛熱多寒少脉長睡卧不安先以大柴胡湯下之微利為度如下過外微印未盡者



宜服白芷湯盡其邪

白芷一兩 知母一兩七 石膏四兩

右為蠶末同煎服。

治瘧無他證隔日發先寒後熱寒少熱多宜桂枝石膏湯

桂枝五錢 石膏二兩五錢 知母二兩五錢 黃芩一兩

右為粗末分作三服每服水一盞同煎服間日者邪氣所含深也

治瘧寒熱大作不論先後此太陽陽明合病也謂之太爭寒作則必戰動經曰熱勝而動也發熱則

必汗泄經曰汗出不愈知為熱也陽盛陰虛之證當內寔外虛不治必傳入陰經也桂枝芍藥湯主之

桂枝三錢 黃耆一兩 知母一兩 石膏一兩 芍藥一兩

右為粗末每服五錢至半兩水煎如前藥服之寒熱轉大者知太陽陽明少陽三陽合病也宜

用桂枝黃芩湯和之

柴胡三錢 黃芩四錢半 人參四錢半 半夏四錢 甘草四錢半 石膏五錢 知母五錢

桂二錢

右為粗末依前服之服藥已如外邪已罷內邪未已再詮下藥從卯至午時發者宜以大柴胡湯

下之從午至酉時發者知其邪氣在血也宜以桃仁承氣湯主之

前項下藥微利為度以小柴胡湯微其微邪之氣立秋之後及處暑前發瘧漸瘦不能食者謂之

瘵瘧此邪氣深達而中陰經為久瘵也

治久瘵不能飲食胸中鬱鬱如吐欲吐不能吐者宜吐則已當以梨蘆葶黃散吐之

梨蘆葶散

大梨蘆末半錢 溫蘆水調下以吐為度



雄黃散

雄黃

瓜蒂

赤小豆 各一錢

右為細末。每服半錢。溫水調下。以吐為度。

治秋深久瘧。胸中無物。又無痰癖。腹高而食少。俗謂瘧氣入腸腹。宜蒼朮湯主之。

蒼朮 四兩

草烏頭 一錢

杏仁 三十個

右為粗末。都作一服水三升。煎至一半。均作三服。一日服盡。迎發而服。局方中七宣丸治瘧之聖

藥也。

局方中神効飲子。乃瘧疾聖藥也。又名交結飲子。

吐論第十七

論曰。吐有三氣。積寒也。皆從三焦論之。上焦在胃口。上通於天氣。主內而不出。中焦在中脘。上通天氣。下通地氣。主腐熟水穀。下焦在臍下。下通地氣。主出而不納。是故上焦吐者。皆從于氣。氣者天之陽也。其脉浮而洪。其證食已暴吐。渴飲水大便秘結。氣上衝而胃發痛。其治當降氣和中。中焦吐者。皆從于積。有陰有陽。食與氣相假為積。而痛其脉浮而弱。其證或先痛而後吐。或先吐而後痛。治法當以吐藥去其積。積去其氣下行。其氣下焦吐者。皆從于塞地道也。其脉沉而遲。其證朝食暮吐。暮食朝吐。小便清利。大便秘而不通。治法當以毒藥通其閉塞。溫其寒氣。大便漸通。作以下焦藥和之。不令大便秘結而自愈也。

治上焦氣熱上衝。食已暴吐。脉浮而洪。宜先和中。桔梗湯。

桔梗 二兩半

半夏 麴 二兩

陳皮 去白 一兩

枳實 一兩

白茯苓 去破 一兩

白朮 二兩半

厚朴 一兩。薑製炒香。右咬咀。每服一兩水一盞。煎至七分。取清溫服。調木香散二錢。隔夜空腹食前服之。三服之後。氣漸



下吐漸止。然後去木香散加芍藥二兩。黃耆一兩半。每料中叩筭。加上件分兩。依前服之。病愈則已。如大便秘結。食不盡下。以大承氣湯去硝。微下之。少利為度。再服前藥補之。如大便秘結。又依前再微下。

木香散

木香

檳榔 各等分

右為細末。前藥調服。

治暴吐者。上焦氣熱所衝也。經曰。諸嘔吐酸暴。主下迫。皆屬于火。脉洪而浮者。荊黃湯主之。

荊芥穗一兩

人參 五錢

甘草 二錢半

大黃 三分

右為麤末。都作一服水二盞煎至一盞。去滓。調檳榔散二錢。空心服。

檳榔散

檳榔 二錢

木香 一錢半

輕粉 少許

右為細末。用前藥調服。如為丸。亦可用水浸。蒸餅為丸。如小豆大。每服二十九。食後

治上焦吐頭發痛。有汗脉弦。鎮青丸主之。

柴胡 七錢

黃芩 七錢半

甘草 半兩

半夏 湯洗

青黛 二十五

人參 五分

右為細末。薑汁浸蒸餅為丸。如梧子大。每服五十丸。生薑湯下。食後。

白木湯

治胃中虛損及痰而吐者。

半夏 麴 半兩

白木 一錢

檳榔 二錢半

木香 一錢

甘草 一錢

茯苓 二錢

右六味同為細末。每服二錢。煎生薑湯調下。食前上而食。脉弦者。肝盛于脾而吐。乃由脾胃之虛。

宜治風安脾之藥。

金乾丸



半夏湯洗 檳榔二錢 雄黃

右為細末薑汁浸蒸餅為丸如桐子大小兒另丸生薑湯下從少至多漸次服之以吐為度羅鮮  
於脾故飲食自下

治中焦吐食由食積與寒氣相假故吐而痛宜服紫沉丸

半夏三錢 烏梅去核 代赭石三錢 杏仁去皮尖 縮砂仁二錢 丁香二錢 沉香一錢

檳榔二錢 木香一錢 陳皮五錢 白豆蔻半錢 白朮一錢 巴豆霜半錢另研

右為細末入巴豆霜令勻醋糊為丸如黍米大每服三十丸食後生薑湯下吐愈則止小兒另丸

治小兒食積吐食大亦妙

一法治翻胃吐食用橘皮壹個浸少時去白裏生薑一塊麝香紙封燒令熟去麝外生薑為三番並  
橘皮下紫沉丸一百丸一日二服得大便通至不吐則止此主寒積氣皆可治嘔吐腹中痛者是無  
積也胃強而乾嘔有聲無物脾強而吐食持寔繫強是以腹中痛當以木香白朮散和之

木香一錢 白朮半兩 半夏二兩 檳榔二錢 茯苓半兩 甘草四錢

右為細末浸煎芍藥生薑湯調下每服三錢

附子丸

治下焦吐食朝食暮吐暮食朝吐大便不通宜附子丸

附子炮五錢 巴豆霜一錢 砒半錢研細

右為研極細銘薑蠟為丸如桐子大每服一二丸冷水送下利則為度利後更服紫沉丸常服不  
令再閉

厚朴丸

主反胃吐逆飲食噎塞氣往上衝心腹中諸疾如此法在後

厚朴三兩半

黃連二兩半

紫苑去土

吳茱萸湯洗

菖蒲

柴胡去苗

桔梗



保命集

卷中

十四

皂角

去皮強

茯苓

去皮

官桂

剉

乾薑

炮

人參

二兩

巴豆霜

兩

蜀椒

去目開口者微炒出汗二兩

川芎

頭

炮製去皮脂

減半

更妙

右為細末

入巴豆霜

勻煉蜜和丸

為劑

旋九桐子大

每服三丸

漸次加至

以利為度

生薑湯下

食

後臨卧

此藥治療與局方溫白丸同

及治處暑以後秋冬間藏府下利大効

春夏再加黃連二兩

秋冬再加厚朴二兩計四兩

治風痙病不能愈者從厚朴丸

依春秋加添外又于每料內加人參

薑蒲

茯苓

去皮

各一兩半

右依

前法

和劑服

治反胃又大便不通者是腸勝胃也

服局方中厚朴丸一二百丸如大便秘用後藥

附子

半兩

巴豆

二枚

砒

一豆許

右為極細末生薑糊為丸如菜豆大

每服一丸白湯下

霍亂論第十八

論曰醫之用藥如將帥之用兵

本草曰良醫不能以無藥愈疾猶良將無兵不足以勝通也

故用藥

如用兵轉窮霍亂者治法同用之急兵不可緩也

故吐瀉不止者其本在于中焦或因渴大飲或飲

而過量或飢而飽甚或濕內甚故陰陽交而不和是為吐瀉

仲景曰邪在上焦則吐邪在下焦則瀉

此名乾霍

邪在中焦則既吐且利此為急病也然吐利為急十死其二

如揮霍撩亂而不得吐瀉此名乾霍

亂必死法曰既有其入必有所出今有其入而不得其出者不也塞也故轉筋吐瀉者其氣有三

一曰火二曰風三曰濕吐為喘熱也王注曰炎熱薄燥心之氣也火能炎上故吐也瀉為濕也

和云

濕多成五泄內經曰濕勝則濡瀉又經曰風勝則動筋屬肝而應于風木故脚轉筋燥急也

內經曰

諸筋反戾水液渾濁皆属于熱故仲景治法曰熱多欲飲水五苓散寒多不飲水者理中丸

凡醫此

證或先五苓散元桂苓甘露散乃吐瀉之聖藥也慎無與粟米粥湯穀入于胃則必死

本草曰粟米

粥湯穀入于胃則必死

本草曰粟米

粥湯穀入于胃則必死

本草曰粟米

粥湯穀入于胃則必死

本草曰粟米

粥湯穀入于胃則必死

本草曰粟米

粥湯穀入于胃則必死

本草曰粟米

粥湯穀入于胃則必死

證或先五苓散元桂苓甘露散乃吐瀉之聖藥也慎無與粟米粥湯穀入于胃則必死

本草曰粟米

粥湯穀入于胃則必死

本草曰粟米

粥湯穀入于胃則必死

本草曰粟米

粥湯穀入于胃則必死

本草曰粟米

粥湯穀入于胃則必死

本草曰粟米

粥湯穀入于胃則必死

本草曰粟米

粥湯穀入于胃則必死

本草曰粟米

粥湯穀入于胃則必死

證或先五苓散元桂苓甘露散乃吐瀉之聖藥也慎無與粟米粥湯穀入于胃則必死

本草曰粟米

粥湯穀入于胃則必死

本草曰粟米

粥湯穀入于胃則必死

本草曰粟米

粥湯穀入于胃則必死

本草曰粟米

粥湯穀入于胃則必死

本草曰粟米

粥湯穀入于胃則必死

本草曰粟米

粥湯穀入于胃則必死

本草曰粟米

粥湯穀入于胃則必死

證或先五苓散元桂苓甘露散乃吐瀉之聖藥也慎無與粟米粥湯穀入于胃則必死

本草曰粟米

粥湯穀入于胃則必死

本草曰粟米

粥湯穀入于胃則必死

本草曰粟米

粥湯穀入于胃則必死

本草曰粟米

粥湯穀入于胃則必死

本草曰粟米

粥湯穀入于胃則必死

本草曰粟米

粥湯穀入于胃則必死

本草曰粟米

粥湯穀入于胃則必死



微鹹味寒無毒主養胃氣去脾胃中熱益氣霍亂者脾胃極損不能傳化加以粟米如人欲斃更以利刀鋸其首豈有能生者耶如吐瀉多時無住之後宜微以粥飲漸以養之以遲為妙治霍亂轉筋吐瀉不止半夏湯

半夏

茯苓

白木各半兩

淡桂二錢半

甘草二錢半

右為細末渴者涼水調下不渴者溫水調下不計時候

五苓散

白木

茯苓

木猪苓各兩

澤瀉二兩半

桂一兩

右為細末冷水調下或水煎三服冷服亦得

理中丸

白木

人參

乾薑

甘草各等分

右為細末煉蜜為丸彈子大每服一丸冷水化下

如吐瀉不止身冷汗出無脈者可服後瀉利論中漿水散兼桂枝湯白木湯皆可用後痢門中藥亦可選用

凡霍亂不可飲熱白米湯飲之死不救

瀉論第十九

論曰臟腑瀉痢其證多種大抵從風濕熱論是知寒少而熱多寒則不能久也故曰暴瀉非陽久瀉非陰論曰春宜緩形形動則肝木乃榮反靜密則是行秋令金能制木風氣內藏夏至則火盛而金去獨火木旺而脾土損矣輕則瀉泄身熱脈洪澀不能化重則下痢膿血稠粘皆屬于火經曰渡而便膿血和氣行而血止也宜大黃湯下之是為重劑黃芩芍藥湯為之輕劑是寔則瀉其子木能自虛而脾土寔矣故經曰春傷于風夏必瀉泄此逆四時之氣人所自為也有自大陰脾經受濕而



為水泄虛滑微滿身重不知穀味假令春宜益黃散補之夏宜瀉之古人法云宜補宜和宜止假令  
和則芍藥湯是也止則呵子湯是也久則防變而為膿血也脾傳腎謂之賊邪故難愈若先痢而後  
滑謂之微邪故易痊此皆脾土受濕天行為也雖聖智不能逃口食味鼻食氣從鼻而入留積于脾  
而為水瀉有厥陰經動下痢不止其脉沉而遲手足厥逆涕唾膿血此難治宜麻黃湯小續命汗之  
法曰謂有表邪縮于內當散表邪而愈有暴下無聲身冷自汗小便清利大便不禁氣難布息脉微  
嘔吐急以重藥溫之漿水散是也故法云後重則宜下腹痛則宜和身重則除濕脉弦則去風血膿  
稠粘以重藥增之身冷自汗以毒藥溫之風邪內縮宜汗之則愈瘧瘧為痢當溫之又云在表者發  
之在裏者下之在上者瀉之在下者竭之身表熱者內疏之小便澀者分利之又曰盛者和之去者  
遠之過者止之兵法云避其來銳擊其惰歸此之謂也凡病泄而惡風寒是太陰傳少陰是土來尅  
水也用除濕白朮茯苓安脾芍藥桂黃連破血也火邪不能勝水也大陰經不能傳少陰而反火邪  
主乘肺經而痢必白膿也如黃連當歸之類又裏急後重脉大而洪寔為裏熱而甚蔽是有物結墜  
也若脉浮大甚不宜下雖裏急後重而脉沉細弱者謂寒邪在內而氣散也可溫養而自愈裏急後  
重閉者大腸經氣不宜通也宜加檳榔木香宣通其氣如痢或泄而嘔者胃中氣不和也上焦不和  
治以生薑橘皮中焦不和治以芍藥當歸桂茯苓下焦不和寒治以輕熱甚以重熱藥大便虛秘  
久不愈恐太陰傳少陰多傳變為痢太陰傳少陰是為賊邪先以枳實厚朴湯以防其變若四肢懶  
倦小便少或不利大便走沉困飲食減宜調胃去濕白朮芍藥茯苓三味水煎服以白朮之甘能入  
胃而除脾胃之濕芍藥之酸澁除胃中之濕熱四肢困茯苓之淡泄能通水道走濕此三味泄痢須  
用此如發熱惡寒腹不痛加黃芩為主如未見膿而惡寒乃太陰欲傳少陰也如黃連為主桂枝佐  
之如腹痛甚者加當歸倍芍藥如見血加黃連為主桂當歸佐之如燥煩或先便白膿後血或發熱  
或惡寒非黃芩不止上部血也如惡寒脉沉或白痛腰或血臍下痛非黃連不能止此中部血也如



惡寒脉沉先血後便非地榆不能除此下部邪也血也如便膿血相雜而脉浮大慎不可以大黃下之。下之必死。謂氣下竭也。而陽無所收也。凡陰陽不和。惟可以分陰陽藥治之。又云暴泄非陰久泄非陽。大便完設下有寒有熱者。脉疾身多動。音聲響亮。暴注下迫。此陽也。寒者脉沉而細。疾身不動。作目睛不可了了。飲食不下。鼻準氣息者。薑附湯主之。若身重四肢不舉。木附湯主之。

黃芩

芍藥 各一兩 甘草 五錢

治泄痢腹痛。或後重身熱久而不愈。脉洪疾者。及下痢膿血稠粘。黃芩芍藥湯。

右為粗末。每服半兩水一盞。半煎至一盞。薑清溫服。無時如痛。則加桂少許。

大黃 一兩

治泄痢久不愈。膿血稠粘。裏急後重。日夜無度。久不愈者。用大黃湯。

右為細剉。好酒二大盞。同浸半日。許再同煎至一盞半。去大黃不用。將酒分為一服。頓服之。痢止。一服如未止。再服。以利為度。服芍藥湯和之。痢止。再服黃芩芍藥湯和之。以徹其毒也。

芍藥湯

下血調氣。經曰。澁而便膿。氣行而血止。行血則衰。濃自愈。調氣則後重自除。

芍藥 一兩

當歸 半兩

黃連 半兩

檳榔

木香 二錢

甘草 二錢

大黃 三錢

右咬咀。每服半兩水二盞。煎至一盞。食後溫服。清如血痢。則漸加大黃。如汗後臟毒。加黃藥半兩。依前服。

白木黃耆湯

服前藥痢雖已除。猶宜此藥和之。

白木 一兩

黃耆 七錢

甘草 三錢

右咬咀。勻作三服。水一盞。半煎至一盞。去滓溫服。清。

治泄痢。飧泄身熱。脉弦。腹痛而渴。及頭痛微汗。宜防風芍藥湯。



防風

芍藥

黃芩各一兩

右以咀每服半兩或一兩水三盞煎至一盞溫服清

治太陰脾經受濕水泄注下體微重微滿困弱無力不欲飲食暴泄無數水穀不化先宜白朮芍藥湯和之身重暴下是大勢來亦宜和之

白朮芍藥湯

白朮一兩

芍藥一兩

甘草五錢

右剉每服一兩水二盞煎至一盞溫服清如痛甚者宜

蒼朮芍藥湯

蒼朮二兩

芍藥一兩

黃芩半兩

右剉每服一兩加淡味桂半錢水一盞半煎至一盞溫服清如脉弦頭微痛者宜

蒼朮防風湯

蒼朮

防風各二兩

上使

右剉同煎服如下血者宜

蒼朮地榆湯

蒼朮二兩

地榆一兩

下使

右剉同煎服

已上證如心下痞每服各加枳實一錢如小便不利每服各加茯苓二錢如腹痛漸已瀉下微少宜  
柯子散

呵子一兩半

生半熟

木香半兩

黃連三錢

甘草三錢



右為細末每服二錢以白朮芍藥湯調下如止之不已宜歸而送之也呵子散加厚朴一兩竭其邪氣也虛滑久不愈者多待變為痢疾太陰傳於少陰是為鬼邪先以厚朴枳實湯防其待變

厚朴枳實湯

厚朴一兩

枳實一兩

呵子一兩半生

木香半兩

黃連三錢

甘草三錢

大黃三錢

右為細末每服三五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服治暴泄如水周身汗出一身盡冷脉微而弱氣少而不能語其甚者加吐此謂急病宜治之以漿水

散

半夏湯洗

附子一兩

乾薑五錢

良薑二錢半

桂五錢

甘草二錢

右為細末每服三五錢漿水二盞煎至一盞和滓熱服甚者三四服微者三服太陽經動下痢為驚漉大腸不能禁固卒然而下成水泄青色其中或有硬物欲起而又下欲了而不了小便多清

此寒也宜溫之春夏桂枝秋冬白朮湯

桂枝湯

桂

白朮

芍藥各半兩

甘草二錢

右剉每服半兩水一盞煎至七分去滓溫服清

白朮湯

白朮

芍藥各三錢

乾薑半兩

甘草二錢

右剉為粗末如前服之甚則去乾薑加附子三錢辛能發也

治厥陰動為瀉痢者寸脉沉而遲手足厥逆下部脉不至咽喉不利或涕唾膿血瀉痢不止者為難治宜升麻湯或小續命湯以發之法云謂表邪縮于內故下痢不止當散表邪于四肢布于絡脉外



無其邪則臟腑自安矣

諸瀉痢入胃名曰瀉飲滑泄渴能飲水水下復瀉而又渴此無藥證當灸大椎

諸瀉痢久不止或暴下者皆太陰受病故不可離芍藥若不濕不能下痢故須用白木是以聖人立法若四時下痢于芍藥白木內春加防風夏加黃芩秋加厚朴冬加桂附然更詳外證寒熱處之如裏急後重須加大黃如身困倦須加白木如通身自汗逆冷氣息微加桂附以溫之如或後重膿血稠粘雖在盛冬于溫藥內亦加大黃

諸下痢之後小便利而腹中虛痛不可忍者此謂陰陽交錯不和之甚也當服神効越桃散

大梔子三錢 高良薑三錢

右和勻每服三錢米飲或酒調下其痛立効

治大便秘下血腹中不痛謂之濕毒下血宜服黃連湯

黃連去須 當歸各半兩 甘草二錢

右以咀每服五錢水一盞煎至七分食後溫服

治大便秘後下血腹中痛者謂熱毒下血當服芍藥黃連湯

芍藥 當歸 黃連各半兩 大黃一錢 桂枝半錢 甘草一錢

右以咀每服半兩同煎煎服如痛甚者調木香檳榔

治久病腸生痛痒不任大便下血地榆湯

蒼朮去皮四兩 地榆二兩

右以咀每服一兩水一盞煎至七分食前多服除根

治濕瀉茯苓湯

白朮一兩 茯苓去皮七



石咀水煎一兩食前服食入而瀉謂胃中有宿穀也如枳寔五錢酒入而瀉濕熱瀉也如黃芩五錢

治寒積痢男子小兒婦人皆不同赤白或清痢如水不後重者寒也經云澄徹清冷皆屬于寒此為虛寒中有積也宜附子巴豆之類下之見利則愈空心服

治瀉痢久臟腑不止虛滑穀不化用蒼朮湯下桃花丸

蒼朮二兩防風一兩

右剉細用水一椀煎至一大盞用清汁下桃花丸八十粒立愈如小便澁少以五苓散下桃花丸或赤石脂丸小便利則愈矣

太陽為脇熱痢涼膈散主之

陽明為癰瘕進退大承氣湯主之珍珠囊中有

少陽風氣自動其脈弦大柴胡湯主之

太陰濕勝濡瀉不可利而可溫四逆湯主之

少陰蟄封不動禁固可澁赤石脂丸乾薑湯主之

厥陰風泄以風治風小續命湯消風散主之

治下痢膿血裏急後重日夜無度導氣湯

均藥一兩當歸五錢

黃芩各一錢半黃連

木香各一錢檳榔一錢

雜例

右為末每服三五錢水一盞煎至七分去滓溫服則如未止再煎服不後重則止

瀉而便膿者小腸泄也脈五至之上洪者宜以七宣丸如脈平者立秋至春分宜香連丸春分至立秋宜芍藥葉皮四季通用宜加減平胃散七宣丸之類後宜服此藥去其餘邪兼平胃氣芍藥



藥皮丸

芍藥

黃蘗 各等分

右為細末醋糊為丸如桐子大每服五七十丸至二百丸溫水下食前加減平胃散

白朮

厚朴

陳皮 各一兩

甘草 七錢

檳榔 三節

木香 三錢

桃仁

黃連

人參

阿膠 各半兩

白茯苓 去皮半兩

右為細末同平胃散煎服血多加桃仁泄加黃連小便澀加茯苓氣不下後重加檳榔木香腹痛加芍藥甘草膿加阿膠濕加白朮脉洪加大黃四時以胃氣為本久下血水則脾虛損而血不流于四肢入于胃中為血宜滋養脾胃則愈

五洩者之病其治法各不同者外證各異也

胃泄者飲食不化多黃承氣湯下

脾泄者腹脹滿泄注食即嘔吐逆津建中理中

大腸泄者食已窘變大便秘白腸鳴切痛乾薑附子

小腸泄者澁便膿血小腹脹承氣湯

大瘕泄者裏急後重數至圉而不能便足少陰是也

經中痛急利小便此五瀉之病也胃小腸大瘕三證皆清涼飲子主之其泄自止後厥陰少陰二證

另有治法厥陰證而加甘草謂主莖中痛是肝也內經曰肝苦急急食甘以緩之少陰經證多裏急

後重故加大黃令急推過物去則輕矣內經曰因其重而減之又曰在下者引而竭之又以太陰陽

明二經證當進退大承氣主之太陰證不能食也當先補而後瀉之乃進藥法也先煎厚朴半兩俱依本方加製水一盞半煎至一半服之若三兩服後未已謂有宿食不消又加枳實二錢同煎服三兩



服泄又未已如稍加食尚有熱毒又加大黃三錢推過泄止住藥如泄未止謂腸胃有久塵垢滑粘如芒硝半合宿垢去盡則愈也陽明證能食是也當先瀉而後補謂退藥法也先用大承氣湯五錢水一盞依前法煎至七分稍熱服如泄未止去芒硝後稍熱退減大黃一半煎兩服如熱氣雖已其人必腹滿又減去大黃枳實厚朴湯各三兩服如腹脹滿退泄亦自愈後服厚朴湯數服則已

又寒熱水泄之例于后

洩者一也總包五法謂之六義曰六解難經有傷寒五泄叔和云濕多成五泄仲景解四經泄痢有不可汗有不可下者可吐可灸者仲景隨經自言之假令渴引飲者是熱在膈上水多入則下高入胃中胃經本無熱不勝其水名曰水泄故使米穀一時下此證當灸大椎三五壯立已乃瀉督也如用藥使車前子雷丸白朮茯苓之類可選用之五苓散亦可又有寒泄者大腹滿而泄又有驚瀉者是寒泄也鴨瀉者大便如水中有少結糞者是也如此者當用天麻附子乾薑之類是也

又法曰泄有虛實寒熱虛則無力粘衣不便已洩出謂不能禁固也寔則數至圓而不能便俗云虛生掣責是也裏急後重皆依前法進退大承氣湯主之一說素問云春傷于風夏必飧泄又云久風為飧泄泄者乃水穀不化而完出非水入胃而成此證非前水泄也此一證不飲水而穀完出名曰飧泄治法于後先以宣風散導之出錢氏方中四味者是也後服蒼朮防風湯

蒼朮

去皮

麻黃

去根節

防風

去蘆頭

右為粗末每服一兩生薑七斤水二盞煎至一盞去滓溫服泄止後服椒朮丸

蒼朮

二兩

小椒

一兩去目炒

右為極細末醋糊為丸如桐子大每服二十丸或三十丸食前溫水下。一法惡痢久不愈者桂加如小兒病丸如粟米大

治瀉痢服血乃至脫肛地榆芍藥湯



蒼木八兩 地榆三兩 卷栢三兩 芍藥三兩

右以咀每服一兩水一大盞半煎至一半溫服清病退藥止

五泄傷寒乃分三節

初說暴 次說中 後說久泄

此說在難經二十二難是三節內包十五法初以暴藥中以的對證藥後疾得中也末治久泄法仲

景論厥陰經治是也

治久泄法先進縮煎小續命湯是發其汗使邪氣不能侵

附子時細切去破 白朮四兩 甘草一兩

右為粗末入附子合勻每服三錢水一大盞半入生薑五片棗一枚劈破同煎至一盞去滓溫服

食前此藥又治風濕相搏身重疼痛不能轉側不嘔不渴大便堅梗小便自利及風虛頭目眩重

者不知食味暖臍補中助陽氣止自汗

治男子婦人心經中搖熱如癰病狀宜服妙香丸風癰者前羌活為引下妙香丸血癰當歸湯引下

一刺心痛諸穴於後

真心痛手足青至節痛甚旦發夕死夕發旦死心痛腹脹嗇嗇然大便不利取足太陰心痛引腰

脊欲嘔取刺足少陰心痛引小腹滿上下無常處使溺難刺足厥陰心痛短氣刺手太陰心痛當

九節刺之立已不已上下求之得之則已

接經三法

心痛與背相接善恐如從後然其心偃僂者腎心痛也先刺經骨崑崙不已刺合骨

心痛腹脹胸滿心尤痛者胃心痛也刺大都太白

心痛如錐刺乃脾心痛也刺然谷大谿

心痛蒼然如死狀終日不得休息乃肝心痛取行間太衝



內然後治其痢秋冬間下痢風吐論中加減厚朴丸大効

凡藏府之秘不可一例治瘕有虛秘有實秘胃實而秘者能飲食小便亦當以麻仁丸七宣丸之類主之胃虛而秘者不能飲食小便清利厚朴湯主之

厚朴

二兩

白木

五兩

半夏

二兩

枳實

右為粗末

每服三五錢水一盞半

生薑五片

棗三枚煎至一盞去滓

溫服空心

寔秘者物也虛秘

進飲食

平胃丸治病久虛弱厭厭不能食而藏府或秘或瀉此胃氣虛弱也常服和中消痰去濕及厚腸胃

厚朴

一兩

白木

二兩

陳皮

八錢

去白

枳實

半錢

甘草

三錢

炙

木香

一錢

右為細末薑汁浸蒸餅丸桐子大每服三五十丸生薑湯或溫水送下

心痛論第二十

論曰諸心痛者皆少陰厥氣上衝也有熱厥心痛者身熱足寒痛甚則煩燥而吐額自汗出知為熱也其脉洪大當灸大谿及崑崙謂表裡俱瀉之是謂熱病汗不出引熱下行表汗通身而出者愈也灸畢服金鈴子散痛止服枳朮丸去其餘邪也有大寔心中痛者因食受時氣卒然發痛或秘或瀉久而足逆而通身冷汗出便利溺清或大便利而不渴氣微力弱急以木附湯溫之寒厥暴痛非久病也朝發暮死當急救之是知久痛無寒而暴痛非熱也治熱厥心痛或發或止久不愈者當用金鈴子散

金鈴子

玄胡

各一兩



右為細末每服三錢酒調下  
大實心痛黃丸

雄黃二兩研

巴豆五錢去皮三月

右再研二味白麴二兩同和再研勻滴水丸如桐子大每服時先煎漿水令沸下藥二十四丸煮  
一二十沸撈入冷漿水沉冷一時服一九一日二十四時加至微利為度用浸藥水送下此治脇  
下症癖痛如神

治大實心痛大便已利宜蒙本湯微其痛也

蒙本半兩

蒼木一兩

右為粗末每服一兩水二盞煎至一盞溫服清

治寒厥暴痛脉微氣弱宜木附湯

木附湯

衝穴心痛卧若徙居心痛間動作益痛甚者其色不誠此肺心痛也刺魚際大淵以通氣行先所凝  
滯則病也

太谿穴足少陰腎經土也為腧在足內踝後根骨上脉動陷中可灸三壯或五七壯此瀉熱厥心痛  
崑崙足太陽膀胱經水也在足外踝後根骨上陷中可灸三壯或五七壯亦可瀉熱厥痛



咳嗽論第二十一

神醫劉守真撰

論曰。咳嗽無痰而有聲。肺氣傷而不清也。嗽是無聲而有痰。脾濕動而為痰也。咳嗽謂有痰而有聲。蓋因傷於肺。氣動於脾。濕咳而為嗽也。脾濕者。秋傷於濕。積於脾也。故內經曰。秋傷於濕。冬必咳嗽。大抵素秋之氣。宜清。湏反動之氣。必上衝而為咳。甚則動於脾。脾濕發而為痰。是知脾無留濕。雖傷肺氣而不為痰也。有痰寒少而熱多。故咳嗽者。非專主於肺。而為病。以肺主皮毛。而司於外。故風寒先能傷之也。內經曰。五臟六腑皆能令人咳。非獨肺也。各以其時主之。而受病焉。非其時。各傳而與之也。所病不等。寒暑燥濕風火六氣。皆令人咳嗽。濕病痰飲入胃。留之而不行。止入於肺。則為咳嗽。假令濕在心。經謂之熱痰。濕在脾。經謂之風痰。濕在肺。經謂之氣痰。濕在腎。經謂之寒痰。所治不同。宜隨症而治之。若咳而無痰者。以辛甘潤其肺。故咳嗽者。治痰為先。治痰者。下氣為上。是以南星半夏。勝其痰。而咳嗽自愈。枳殼陳皮。利其氣。而痰飲自除。痰而能食者。大承氣湯。微下之。少利為度。痰而不能食者。厚樸湯治之。夏月嗽而發熱者。謂之熱痰。嗽小柴胡四兩加石膏一兩。知母半兩。用之。冬月嗽而發寒熱者。謂之寒嗽。小青龍加杏仁服之。然此為大例。更當隨時隨症加減之。量其虛實。此治法之大體也。

蜜煎生薑湯

蜜煎橘皮湯

燒生薑胡桃

此三者皆治無痰而嗽者。當以辛甘潤其肺。故也。如但用青陳皮藥。皆當去白。本草云。陳皮味辛。理上氣。去痰氣。滯塞青皮味苦。理下氣。二味俱用。散三焦之氣也。故聖濟云。陳皮去痰。穢不除。即生痰。麻黃發汗。節不去而止汗。治風疾。熱咳嗽。其脉弦。面青。四肢滿悶。便溺秘澀。心多燥怒。水煮金花丸。



南星

半夏各二兩 生用

天麻錢五

雄黃錢二

白麵

寒水石一兩 燒存性

右為細末。滴水為丸。每服五七十丸。至百丸。煎漿水沸下。藥煮令浮為度。漉出。淡漿水浸。另用生薑湯下。或通聖加半夏及局方中川芎丸。防風丸。皆可用也。

小黃丸治熱痰咳嗽脉洪。面赤煩熱。心痛。唇口乾燥。多喜笑。宜小黃丸。

南星

半夏各一兩 洗

黃芩一兩 半

右為細末。生薑汁浸。蒸餅為桐子大。每服五丸至七十丸。食後薑湯下。及小柴胡湯中。加半夏亦可。

白朮丸治痰濕咳嗽脉緩。面黃肢體沉重嗜卧不收。腹脹而食不消化。宜白朮丸。

南星

半夏各一兩 洗

白朮一兩 半

右為細末。糊為丸。如桐子大。每服五七十丸。生薑湯下。及局方中。防已丸亦可。

玉粉丸治氣痰咳嗽脉澀。面白上喘氣促。洒淅惡寒。愁下。藥宜服之。

南星

半夏各一兩 洗

官桂一兩 去皮

右為細末。糊為丸。如桐子大。每服五七十丸。生薑湯下。食後服。及局方中。防已丸亦可。玉粉丸加減在後。心下不者。加枳實五錢。身熱甚者。加黃連五錢。體重者。加茯苓一兩。氣上逆者。加苦亭藎五錢。氣促者。加人參。桔梗各五錢。浮腫者。加郁李仁。杏仁。各五錢。大便秘者。加大黃五錢。

雙玉散治痰熱而喘。痰湧如泉。

寒水石

石膏各等分

右為細末。煎人參湯調下三錢。食後服。

治痰千緡丸

半夏一兩 生味

大皂角半兩 去皮子

右同於絹袋中盛之。用水三升。生薑七大片。同煎至升半。以手搗洗之。取清汁。分作三服。食後併

右同於絹袋中盛之。用水三升。生薑七大片。同煎至升半。以手搗洗之。取清汁。分作三服。食後併

右同於絹袋中盛之。用水三升。生薑七大片。同煎至升半。以手搗洗之。取清汁。分作三服。食後併

右同於絹袋中盛之。用水三升。生薑七大片。同煎至升半。以手搗洗之。取清汁。分作三服。食後併

右同於絹袋中盛之。用水三升。生薑七大片。同煎至升半。以手搗洗之。取清汁。分作三服。食後併



服二服効。

防風丸治痰嗽胸中氣不清利者。枳木丸亦妙。

防風

枳壳

白木

右為細末燒飯為丸每服五七十丸生薑湯下。

天麻丸

天麻

半夏

南星

雄黃

右以白麵二兩滴水為丸如桐子大每服五十九至百丸煎淡水令沸下藥煮十餘沸漉出食前

生薑湯下。

利膈丸主胸中不利痰嗽喘促利脾胃壅滯調秘瀉臟推陳致新消進飲食治利膈氣之聖藥也。

木香

檳榔

人參

當歸

藿香

大黃

厚樸

枳實

甘草

右為細末滴水如桐子大每服三五十九食後諸飲皆下。

欬氣丸治久嗽痰喘肺氣浮腫。

青皮

陳皮

檳榔

木香

杏仁

郁李仁

茯苓

澤瀉

馬兜零

苦亭

當歸

黃芪

人參

防己

牽牛

右為細末生薑汁麵糊為丸如梧子大每服一二十丸加至五七十丸生薑湯下食後服。

玉粉丸治痰結咽喉不利語音不出。

半夏

草烏

肉桂

右同為末生薑汁浸蒸餅為丸如雞頭大每服一丸至夜含化多歲不愈者亦效。

枳壳湯治久痰胸膈不利者多上焦發熱。



保命集

卷下

枳壳製炒去穢三兩

桔梗三兩

黃芩一兩半

右同剉。每日早用二兩半。水三盞煎至二盞。勻作三服。午時一服。申時一服。臨卧時一服。三日七兩半。約盡。服生半夏湯。

生半夏湯

半夏不拘多少洗七遍切作片

右每服秤三錢。水一盞半。入生薑五大片。同煎至一盞。和滓食後服。一日二三服。服三日畢。再服枳朮丸。盡其疾為度。論曰。先消胸中氣。後去膈上痰。再服枳朮丸。謂首尾合盡。消其氣。謂令痰不復作也。

清鎮丸治熱嗽

小柴胡湯內加人參一倍

青黛兩半

右為細末。麵糊為丸。如桐子大。每服五十丸。生薑湯下。

半夏丸治因傷風而痰作喘逆。兀兀欲吐。惡心欲倒。已吐加檳榔三錢。

半夏湯洗切

雄黃三錢研

右同為末。生薑汁浸蒸餅為丸。如桐子大。每服三十丸。生薑下。小兒丸如黍米大。

白朮散治夏暑大熱。或醉飲冷。痰濕不止。膈不利。

白朮

茯苓

半夏洗

黃芩焙等

右為粗末。每服五錢。至七錢。水二盞。入生薑十片。煎至一盞。去滓。調陳皮末一錢。神麴末一錢。食後服。法曰。大熱。大飲。蓋酒。味熱。而引飲。冷冷與熱。疑於胸中不散。而成濕。故痰作矣。甚者宜吐之。吐後服五苓。甘露。勝濕。去痰之劑。

白朮湯治痰潮上如湧。泉久不可治者。

白朮

白茯苓

半夏等分



右為末每服半兩病大者一兩水二盞生薑七片煎至一盞取清汁調神麴末二錢頓服之病甚者加玉壺丸一百丸大效永除根

天門冬丸治婦人喘手足煩熱骨蒸寢汗口乾引飲面目浮腫

天門冬

麥門冬

去心

生地黃

汁為膏

右二味為末和膏子為丸如梧子大每服五十丸煎逍遙散送下逍遙散中去甘草加入參或服王氏博濟方中參荊芥散亦可如面腫不已經曰面腫曰風故宜汗麻黃桂枝可發其汗後服柴胡飲去大黃故論曰治臟者治其俞治腑者治其合治浮腫者治其經治俞者治其土也治合者亦治其土也如兵家圍魏救趙之法也

### 虛損論第二十二

論曰虛損之疾寒熱因虛而感也感寒則損陽陽虛則陰盛損自上而下治之宜以辛甘淡過於胃則不可治也感熱則損陰陰虛則陽盛故損自下而上治之宜以苦酸鹹過於脾則不可治也自上而損者一損於肺皮聚而毛落二損損於心血脉虛少不能榮於臟腑婦人月水不通三損損於胃飲食不為肌膚自下而損者一損於腎骨痿不能起於床二損損於肝筋緩不能自收持三損損於脾飲食不能消克論曰心肺損而色蔽腎肝損而形痿穀不能化而脾損感此病者皆損之病也漸漬之深皆虛勞之疾也

四君子湯治肺損而皮聚毛落益氣可也

白朮

人參

黃耆

茯苓

各等

右為粗末每服五六錢或七錢水一盞煎至七分去滓食後溫服

八物湯治心肺虛損皮聚而毛落血脉虛損婦人月水愆期宜益氣和血

白朮

人參

黃耆

茯苓

當歸

芍藥

川芎

熟地黃

各等



右為粗末每服五七錢水一盞煎至七分去滓食後溫服  
十全散治心肺損及胃飲食不為肌膚宜益氣和血調飲食

白朮 人參 黃耆 伏神 肉桂 當歸 川芎 熟地黃

芍藥 甘草各等分

右為末加生薑紅棗同煎水一大盞約五錢煎至七分食前日三服

金剛丸治腎損骨痿不能起於床宜益精

草薢 杜仲炒去絲 菴蓉酒浸 兔絲子各等分

右為細末酒煮猪腰子搗為丸如桐子大每服五七十九空心酒下

牛膝丸治腎肝損骨痿不能起於床筋緩不能收持宜益精煖中

牛膝 草薢 杜仲炒去絲 菴蓉酒浸 防風 兔絲子 白蒺藜各等分 肉桂半

右為細末酒煮猪腰子搗為丸如桐子大空心酒下五七十九

煖腎丸治腎肝損及脾損穀不化宜益精煖中消穀

牛膝 草薢 杜仲 菴蓉 防風 兔絲子 白蒺藜 胡蘆巴

破故紙各等分 肉桂半

右和劑服餌如金剛丸法腰痛不起者甚效

黑地黃丸加五味子名腎氣丸治陽虛陰虛脾腎不足房室虛損形瘦無力面多青黃而無常色宜用此藥養血益腎

蒼朮一斤米泔水浸 熟地黃斤 川蘆冬二兩夏五錢各七錢 五味子半斤

右為細末棗肉為丸如梧子大每服一百丸至二百丸食前米飲湯下或酒下治血虛久之甚效  
經曰腎苦燥急食辛以潤之開腠理致津液通氣五味子味酸故酸以收之此雖陽盛不燥熱乃



是五臟虛損於內故可益血收氣也此藥類象神品藥也

治陽虛陰盛心肺不足宜八味丸若形體瘦弱無力多困倦怠陰陽先損夏月地黃丸春秋宜腎氣丸冬月宜八味丸

### 消渴論第二十三

論曰消渴之疾三焦受病也有上消中消腎消上消者上焦受病又謂之膈消肺也多飲水而少食大便如常或小便清利知其燥在上焦也治宜流濕潤燥中消者胃也渴而飲食多小便黃經曰熱能消穀知熱在中法云宜下之至不欲飲食則愈腎消者病在下焦初發為膏淋下如膏油之狀至病成而面色梨黑形瘦而耳焦小便瀉而有脂治法宜養血以肅清分其清濁而自愈也法曰燥上而渴辛甘而祛用潤肺故可用蜜煎生薑湯大器頓之時時呷之法云心肺之病莫厭頻而少飲內經云補上治宜以緩又曰辛以潤之開腠致津液通則肺氣下流故氣下火降而燥衰矣其渴乃止又經曰二陽結為消王註曰二陽結於胃及大腸俱熱也腸胃藏熱則善消水穀用辛甘降火之劑黃連末一斤生地黃自然汁白蓮花藕自然汁牛乳汁各一斤熬成膏調連末為丸如桐子大每服

三十丸少呷溫水送下日進十服渴病立止

治上焦膈消而不欲多食小便清利宜小柴胡湯或加白虎湯或錢氏中地骨皮散內加芍藥

黃耆石膏黃芩桔梗之類是也

人參石膏湯治膈消上焦煩渴不欲多食

人參<sub>錢二</sub>石膏<sub>錢二</sub>知母<sub>錢二</sub>甘草<sub>錢四</sub>

右為粗末每服五錢至七錢水煎食後溫服

順氣散治消中熱在胃而能食小便赤黃微利之為妙不可多利服此藥漸漸利之不欲多食則愈

厚樸<sub>錢一兩</sub>大黃<sub>錢四</sub>枳實<sub>錢三</sub>



右判每服五錢水煎食後服

茵香散治腎消病下焦初症小便如膏油

茵香炒

苦練炒

右為細末酒調二錢食前服

八味丸治腎消大病加減法

本方內倍加山藥外桂附從四時加減假令方內桂附用一兩春各用三錢夏用一錢秋用五錢冬全用一兩

珍珠粉丸治白淫夢泄遺精及滑出而不收

黃柏一斤

散新瓦上燒令通赤為度

真蛤粉一斤

右為細末滴水為丸如桐子大每服一丸空心酒下法曰盛陽乘陽故精泄也黃柏降火蛤粉鹹而補腎陰也又治思想無窮所願不得之症

竹龍散治消渴

五靈脂

黑豆去皮

右等為細末每服三錢冬瓜湯調下無冬瓜苗葉皆可日二服小渴二三服効渴定不可服熱藥惟服八味丸去附子加五味子

腫脹論第二十四小兒附

靈樞經論云帝問岐伯脹形何如岐伯曰夫心脹者心煩氣短卧不安肺脹者虛滿而喘咳肝脹者脇下滿而痛引小腹脾脹者善噦四肢煩倦體重不能勝夜卧不安腎脹者引背央央然腰痛六腑脹胃脹者腹滿胃脘痛鼻聞焦臭妨於食大便難大腸脹者腸鳴痛而濯濯冬日重於寒則飧泄食不化小腸脹者小腹填滿引腰而痛膀胱脹者小腹氣滿而氣癢三焦脹者氣滿於皮膚中磳磳



然而不堅脹者脇下痛脹口苦善恐怒又水脹篇云帝問岐伯水脹何如答曰水始起也目窠上微腫如新卧起之狀其頸脉動咳陰股間寒足脛腫腹乃大其水已成矣以手按其腹隨手而起如裹水之狀此其候也帝曰膚脹何如岐伯曰膚者寒氣客於皮中鼓空空然不堅腹身大盡腫皮厚按其腹實而不起腹色不變此其候也鼓脹何如答曰腹脹身皆大大與膚脹等也色蒼黃腹筋起此其候也腸覃何如答曰寒氣客於腸外與衛相傳氣不得榮因有所繫癖而內着惡氣乃起瘕肉生其始大也大如雞子稍以益大至其成如懷子狀久離歲按之則堅推之則移月事不以時下此其候也石瘕何如答曰石瘕生於胞中寒氣客於子門閉塞氣不通惡血當瀉蟬以留止日以益大狀如懷子月事不時皆生於女子可導而下帝曰膚脹鼓脹可刺邪曰先瀉其脹之血絡復調其經刺去其血絡可也

經云平治權衡去菟陳剉開鬼門潔淨府平治權衡者察脉之浮沉也去菟陳剉者疏滌腸胃也開鬼門潔淨府者發汗利小便也又鼓脹之病治以雞屎醴名醫云其腫有短氣不得卧為心水兩脇痛為肝水大便鴨漉為肺水四肢皆腫為脾水腰痛足冷為腎水口苦咽乾為胆水乍虛乍實為大腸水各隨其經絡分其內外審其脉症而別之夫有風水皮水石水黃汗推各臟以論之風合歸肝皮合歸肺黃汗歸脾石合歸腎風水脉浮必惡風皮水脉亦浮按下沒指石水脉沉腹滿不喘黃汗脉沉遲發熱而多涎久而不愈必致癰膿水腫脉浮帶數必是虛寒潛止其間久必沉伏沉伏則陽虛陰實為水必矣要知水脉必沉是也論曰脉出者死與病不相應也諸唇黑則傷肝缺盆盈平則傷心臍出則傷脾足平則傷腎背平則傷肺此五者必不可療也治法云腰以上宜發汗腰以下利小便錢氏論虛實腹脹實則不因吐瀉久病之後亦不因下利脹而喘急悶亂更有疾有熱及有宿食不化而脹者宜服大黃丸白餅子紫霜凡下之更詳認大小便如俱不通先利小便後利大便虛則久病吐瀉後其脉微細肺主目胞腮虛腫手足冷當先服壅氣丸後服異功散及和中丸益黃散



溫其氣 因於氣腫者橘皮煎丸 因於濕為腫者煎防己黃耆湯調五苓散 因於熱為腫者服八正散 又一法燥熱於肺為腫者乃絕水之源也當清肺除燥水自生矣於鼓椎湯中加黃芩如熱在下焦陰消使氣不得化者當益陰則陽氣自化也黃蘗黃連是也

五脉論五水灸法

青水灸肝井 赤水灸心榮 黃水灸脾俞 白水灸肺經 黑水灸腎合

婦人蠱脉無脉燒青丸 五皮散亦是

論諸蠱脹者有二種若從胃則旦食而夜不能食旦則不脹夜則脹是也若水腫症濡泄者是也內經曰蠱脹之病治以雞屎醴酒調服水脹之病當開鬼門潔淨府也

白茯苓湯名變水

白茯苓 澤瀉各二兩 郁李仁錢二

右咬咀作一服水一椀煎至一半常服無時從少至多服或煎得澄入生薑自然汁在內和麵或做粥飯作頓食五七日後覺脹下再加以白朮散

白朮 澤瀉各半兩

右為細末煎服三錢茯苓湯調下或丸亦可服三十丸

未治之藥服黃耆芍藥建曲之類以調養之平復後忌房室猪魚鹽麪等物

治水氣蠱脹潔淨府猪實子丸

猪實子一斗水二斗煎成膏 白丁香半兩 茯苓三兩去皮

右二味為細末用猪實膏為丸如桐子大不計丸數從少至多服至小便清利及腹脹減為度後服中治藥未治藥調養藥疏啟其中忌甘苦酸補其下五補七宣

取沉法



治腫治其經治金火也并榮俞經陰經金也合木水火陽經火也  
治腫木香散

木香

大戟

白牽牛各等

右為細末每用三錢猪腰子一對批開放藥在內燒熟空心服之如左則塌左右則塌右如水腫不能全去於腹上塗甘遂末在繞臍滿腹少飲甘草水其腫便去也

治水腫 螻蛄去頭尾與葡萄心同研露七日晒乾為細末淡酒調下暑月濕用尤佳

又方棗一斗鍋內入水上有四指用大戟并根苗蓋之遍盆合之煮熟為度去大戟不用旋旋喫飲無時盡棗決愈神效

### 眼目論第二十五

論曰眼之為病在腑則為表當除風散熱在臟則為裡宜養血安神暴發者為表而易治久病者在裡而難愈除風散熱者瀉青丸主之養血安神者定志丸婦人熟地黃丸是也或有體肥氣盛風熱上行目昏澀者槐子散主之此由胸中氣濁上行也重則為痰厥亦能損目常使胸中氣清無此病也又有因目疾過藥多而損氣者久之眼漸昏弱乍明乍暗不欲視物此目少血之驗也熟地黃丸消風散定志丸相須而養之或有視物不明見黑花者此謂之腎氣弱也宜補腎水駐景丸是也或有暴失明者謂眼居諸陽交之會也而陰及閉之此風邪內滿當有不測之疾也翳膜者風熱重而有之或癰入眼此肝氣盛而發在表也翳膜已生在表明矣當發散而去之反疏利則邪氣內陷為翳則深也邪氣未定謂之熱翳而浮邪氣已定謂之冰翳而沉邪氣牢而深者謂之陷翳當以熅發之物使邪氣再動翳膜乃浮輔以退翳之藥則翳自能去也病久者不能速效當以歲月除之治眼赤暴發腫散熱飲子

防風

羌活

黃芩

黃連各等分



右剉每服半兩。水二盞煎至一盞。食後溫服。如大便痛澀。加大黃一兩。如痛甚者。加當歸地黃。如煩燥不能卧。加梔子一兩。

川芎散治風熱上衝。頭目眩熱。腫及胸中不利。

川芎 梔子各一兩

右細末。三錢。如胸中氣滯不利。生薑湯調。目疾茶調。風熱上攻。吹咀一兩。水煎。食後服。治眼久病昏澀。因發而久不愈。地黃湯。

防風 羌活 黃芩 黃連 地黃 當歸

人參 茯神各等

右為粗末。每服五七錢。水一盞半。煎至一盞。去滓。食後溫服。

槐子散

槐子 黃芩 木賊 蒼朮各等

右為細末。清茶調下。食後服。

治眼生翳膜。及癰入眼。焮赤已過者。瀉青丸主之。當半減大黃。如大便秘。焮氣未定。依方服之。

治冰翳久不去者。羚羊角散主之。

羚羊角 升麻 細辛 甘草各等

石為細末。一半為散。一半蜜為丸。如桐子大。每服五七十九。以羚羊角散下之。食後臨卧。米泔水煎服。

治太陽經衛虛。血實。腫赤。臉重。頭中濕淫。膚脉睛痛。肝風盛。眼黑。腎虛。桔梗丸。

桔梗 牽牛 取頭末

右二味為末。煉蜜為丸。如桐子大。每服四五十九。加至百丸。食前溫水下。日二服。

金絲膏 點眼藥

生薑 四兩 取汁 白沙蜜 一斤 煉 豬膽汁 三錢 黃連 四兩 梔子 五升



右先煎黃連水後入薑汁次入蜜同煎去沫淨次入下項藥末

腦子四錢

麝香三錢

硃砂四錢

硃砂三錢

輕粉五錢

熊胆四錢

青鹽三錢

右為極細末攪勻熬令稀膏點用

治眼暴赤發噴痛不可忍者救苦丸

黃連二兩

當歸二錢

甘草一錢

右同剉細末水半碗浸一宿以慢火熬灼至一半以棉濾去滓以淨為妙用大再熬作稠膏子為

度攤在椀上倒合以物蓋之用熟艾一大彈子許底下燃之用艾煉膏子艾盡為度再入下項藥

朱砂一錢

腦子五錢

乳香

沒藥各錢

右同研極細末入黃連膏內攪和為丸如米大每用二丸點眼大角內仰面卧藥化則起

治眼發赤腫毒氣侵睛脹痛宣毒散

盆硝

雄黃

乳香

沒藥各等分

右為極細末以少許鼻內噴之

治眼風毒發腫鼻中欲嚏嚏多大損而生瘡宣風散

川芎

甘菊各二錢

乳香

沒藥各三錢

右和勻再研極細末以少許鼻內噴之

目能遠視不能近視局方中定志丸目能近視不能遠視萬壽地之丸

生薑四兩

天門冬四兩

枳殼二兩

甘菊二兩

右為細末煉蜜為丸如桐子大或清茶或溫酒下一百丸食後服此藥能愈大風熱

洗眼藥

呵子二兩

黃丹四兩

白蜜八兩

柳枝四十寸



右以河水二碗熬至半碗用一錢熱水化洗之石器內熬  
治眼赤睛以青婆蛆不拘多少淘淨晒乾末之令害眼人仰卧合日用藥一錢散在眼上須臾藥行  
待少時去藥赤睛亦無  
治倒睫 無名異末之捺捲在紙中作燧子點着到藥處吹散以烟熏睫自起

瘡瘍論第二十六

論曰瘡瘍者火之屬。須分內外。以治其本。內經曰。膏粱之變。足生大疔。其原在裡。發於表也。受持如  
虛言。內結而發諸外。未知從何道而出。皆是從虛而出也。假令大陽經虛。從背而出。少陽經虛。從鬢  
而出。陽明經虛。從鬚而出。督脉經虛。從腦而出。又經曰。地之濕氣。感則害人皮膚筋脉。其在外。感則  
內行。若其脉沉實。其先疎其內。以絕其源也。其脉浮大。當先托裡。恐氣傷化是也。有內外之中者。邪  
氣至甚。逼絕經絡。再發癰腫。經曰。血氣不從逆於肉理。乃生癰疽。此因先法裡及失疏通。又失和榮衛  
也。治瘡之大要。須明托裡。疎通和榮衛。三法。托裡者。治其外之內。疏通者。治其內之外。和榮衛者。治  
其中也。內之外者。其脉沉實。發熱煩燥。外無焮赤痛。其邪氣深於內也。故先疏通。以絕其原。外之內  
者。其脉浮數。焮腫在外。形症外顯。恐邪氣極而內行。故先托裡。內外之中者。外無焮惡之氣。內亦臟  
府宣通。知其所在。經當和榮衛也。用此三法之後。雖未差。必無變症。亦可使邪氣峻減。而易痊愈。故經  
曰。諸痛痒瘡瘍。皆屬心火。又曰。知其要者。一言而終。不知其要。流散無窮。  
鍼灸法曰。凡瘡瘍可灸。刺者。須分經絡。部分血氣。多少。俞穴遠近。若從背而出者。當從太陽五穴。隨  
症選用。或刺或灸。泄其邪氣。 太陽多血少氣。

至陰

通谷

束骨

崑崙

委中

從髻而出者。當從少陽五穴選用。

少陽少血多氣

竅陰

夾谿

臨泣

陽輔

陽陵泉



從髀而出者當從陽明五穴選用

陽明多血少氣

厲兌

內庭

陷谷

衝陽

解谿

從腦而出者初覺腦痛不可忍且欲生瘡也腦者髓之海當灸刺絕骨以泄邪氣隨者舍也故脉浮者從太陽經依前選用脉長者從陽明經依前選用脉絃者從少陽經依前選用論曰諸經各有井榮俞經合井主心下滿及瘡色青榮主身熱及瘡赤色俞主體重節痛瘡黃色經主咳嗽寒熱瘡白色合主氣逆而泄瘡黑色隨經病而有此症者或宜灸宜鍼以泄邪氣經曰邪氣內蓄則腫熱宜破刺之也內經曰夫癰氣之息者宜以鍼開除之氣勝血聚者宜石而泄之王注曰石破也可以破大癰出膿今以排鍼代之凡瘡瘍已覺微腫腫硬皮肉不變色脉沉不痛者當外灸之引邪氣出而方止如已有膿水者不可灸當刺之淺者亦不灸經曰陷者灸之如外微覺木硬而不痛者當急灸之是邪氣深陷也淺者不可灸慎之

諸病瘡瘍如嘔者是濕氣浸於胃也藥中亦倍加白朮服之

內疎黃連湯治嘔噦必逆發熱而煩脉沉而實腫硬木悶而皮肉不變色根深大病在內臟腑秘澀當急疎利之

黃連

芍藥

當歸

檳榔

木香

黃芩

薄荷

山梔子

桔梗

甘草各一

連翹二

右除檳榔木香二味為細末外並剉每服一兩水一盞半煎至一盞先吃一二服次每服加大黃一錢再服加二錢以利為度如有熱症止服黃連湯大便秘澀加大黃覺無熱症少煎沒藥內托復煎散時時服之如實無熱及大小便通止服復煎散稍有熱症却服黃連湯秘則加大黃如此內外皆通禁衛和調則經絡自不遏絕矣

治腫嫩於外根繫不深形症在表其脉多浮痛在皮肉邪氣盛則必侵於內急瀉內托以救其裡也



服內托復煎散

地骨皮 黃耆

芍藥

黃芩

白朮

茯苓

人參

柳桂味淡者

甘草 防己

當歸各一兩 防風二兩

右咬咀先煎蒼朮一斤用水五升煎至三升去朮滓入前藥十二味再煎至三四盞絞取清汁作三四服終日服之又煎蒼朮滓為湯去滓再依前煎服十二味滓此除濕散鬱熱使胃氣和平如或未已再配半料服之若大便秘及煩熱少服黃連湯如微利及煩熱已過却服復煎散半料如此使榮衛俱和邪氣不能內侵也

治諸瘡癰臟腑已和如痛不可忍者可服當歸黃耆湯并加減在後

當歸 黃耆

地黃

川芎

芍藥

地骨皮各等分

右咬咀每服一兩水一椀煎至半椀去滓溫服如發熱者加黃芩煩熱不能卧者加梔子如嘔是濕氣侵胃也倍加白朮

膏藥方

好芝麻油半斤

當歸兩半

杏仁四十九個去皮

桃柳枝各四十九條長四指

右用桃柳二大枝新綿一塊包藥繫於一枝上內油中外一枝攪於鉢器內煎成入黃丹三兩一處熬水中滴成不散如珠子為度

治金絲瘡二云紅絲癰其狀如線或如繩巨細不等經所謂丹毒是也但比烟毒不甚廣濶人患此疾頭手有之下行至心則死下有上行亦然法當於瘡頭截經而刺之以出血後嚼淨草根塗之立愈

治從高墜下涎潮昏冒此驚恐得也苦杖散

右以苦杖不拘多少研細末熱酒調下如產後瘀血不散或聚血皆治之  
治疔瘡奪命散



烏頭尖

附子底

蝎稍

雄黃錢一

蜈蚣對

硃砂

粉霜

輕粉

麝香

乳香各五

信石二錢

腦子對

右為細末先破瘡出血畢以草杖頭用紙帶入於內以深為妙

治瘡難消不能作膿痛不止木香散

地骨皮二兩去皮

木香兩

穿山甲二錢

麝香錢一

右為細末酒調下三錢及小兒班後生癰米飲湯調下效如神

治疔瘡毒氣入腹昏悶不食

紫花地丁

蟬殼

管仲各半

丁香

乳香錢一

右為細末每服二錢溫酒調下

治瘰癧有死肉者及追膿

白丁香

輕粉

粉霜

雄黃

麝香錢一

巴豆三個

右同研細末新飯和作錠子用之

治諸瘡疼痛不變肉色謾腫光色名曰附骨癰如神三生散

露蜂房

蛇退皮

頭髮各等分

右三味燒灰存性研細末酒調下三錢

治腸脫移熱於小腸上為口瘡好飲酒人多有此疾當用導赤散五苓散各半兩煎服

治少陰口瘡半夏散若聲絕不出者是風寒遏絕陽氣不伸也

半夏二兩

肉桂兩

草烏頭兩

右藥同煎一盞水分作二服其效如神

治太陰口瘡甘馨散

用生甘草寸

白礬一兩

放口內含化嚥津



治赤口瘡乳香散  
治白口瘡沒藥散

瘰癧論第二十七

用乳香  
用沒藥  
乳香  
雄黃各一錢  
白礬五分  
輕粉五分  
巴豆霜許少  
研細末擦用

夫瘰癧者。經所謂結核是也。或在耳前後連及頤頤下連鉄盆。皆為瘰癧。或在胸及胸之側下連兩脇皆為馬刀。手足少湯主之。此經多氣少血故多堅而少軟。膿白而稀如泔水狀。治者求水清可也。如瘰癧生在別經。臨時於銅人內隨其所屬經絡部分對症之穴灸之。并依經內藥用之。獨形而小者為結核。續數連結者為瘰癧。形表如蛤者為馬刀。

治馬刀連翹湯

連翹二斤  
蘆麥一斤  
大黃三兩  
甘草一斤

右咬咀一兩。水兩碗煎至一盞半。早食後已時服在頤兩邊是屬少陽經。服藥十餘日後可於臨泣穴灸二七壯。服藥不可住。至六十日決効。又有一方。加大黃不用甘草。更加貝母五兩。雄黃七分。檳榔半兩。同研末。熱水調下三五錢。

治瘰癧文武膏即桑椹膏

痔疾論第二十八

用文武實黑熟者二斗許以布袋取汁。放石器中。熬成薄膏。白湯點一匙。日三服。

論曰。手陽明大腸。名曰害蜚。蜚也六元正紀論。陽明又曰。司殺府。手陽明屬金大腸名害蜚。謂金能害五虫。又曰。司殺府。謂金主殺。既有此二名。何以自生虫。蓋謂三焦相火盛而能制陽明。金故木來相侮。內經曰。侮謂勝已也。木主生五虫。叔和云。氣主生於脾臟。傍大腸疼痛。陣難當。漸覺稍瀉。三焦熱莫護。多方立紀綱。此言飲酒多食熱物。脾生大熱而助三焦氣盛。大能生土也。當瀉三焦火熱。退使金得氣而反制木。木受制則五虫不生。病自愈矣。

蒼木澤瀉丸



蒼朮四兩 去皮

澤瀉二兩

枳實二兩

地榆一兩

皂子二兩 燒

右為細末燒飯為丸如桐子大每服三十丸食前或酒或米飲湯下

又方 川烏炮

古石灰煅

依前丸服

淋洗藥 天仙子

荊芥

川椒

蔓荊子各等分煎湯洗

黑地黃丸治痔之聖藥也在虛損門下有方

婦人胎產論第二十九

論曰婦人童幼天癸未行之間皆屬少陰天癸既行皆從厥陰論之天癸已絕乃屬太陰經也治胎產之病從厥陰經者是祖生化之源也厥陰與少陽相為表裡故治法無犯胃氣及上二焦為三禁不可汗不可下不可利小便發汗者同傷寒下早之症利大便則脈數而已動於脾利小便則內亡津液胃中枯燥製藥之法能不犯三禁則榮衛自和榮衛和而寒熱止矣外則和於榮衛內則調於清便先將此法為之初治次後詳而論之見症消息同壞症傷寒為之緩治或小便不利或大便秘結或積熱於腸胃之間或以成瘕或散血氣而為浮腫蓋產理多門故同傷寒壞症如發渴用白虎氣弱用黃耆血刺痛而用以當歸腹中痛而加之芍藥已上例症不犯三禁皆產後之久病也凡產後暴病禁犯不可拘也如產後熱入血室者桃仁承氣抵當湯之類是也胃堅燥者夫承氣不可以泄約言之產後泄人多用烏金四物是不知四時之寒熱不明血氣之虛與實盲然一概用藥如此而愈加增劇是醫人誤之耳大抵產病天行從增損柴胡雜症從加添四物然春夏雖從柴胡秋冬約用四物藥性寒熱病症虛實不可不察也四物湯常服服餌四時各有增損今具增損於後

春倍川芎百發百中夏倍芍藥百發百中秋倍地黃百發百中冬倍當歸百發百中

不愈者謂失其輔也春防風四物加防風夏黃芩四物加黃芩秋天門冬四物加天門冬冬桂枝四物加桂枝

此四時常服隨症用之也如血虛而腹痛微汗而惡風四物加茂桂謂之腹痛六合如風虛眩運加



秦光羌法謂之風六合。如氣虛弱起則無力。匡然而倒。加厚朴陳皮謂之氣六合。如發熱而煩不能安卧者。加黃連梔子謂之熱六合。如虛寒脉微氣難布息不渴清便。自調加乾薑附子謂之寒六合。如中溫身沉重無力身涼微汗。加白木茯苓謂之溫六合。此婦人常病及產後病通用之藥也。治婦人虛勞局方中謂之首尾六合者。如人聖散下熟乾地黃丸。是治無熱虛勞。專其養也。中道藥牡丹煎如空心食前服。人參荊芥散。臨卧食後服。是治有熱虛勞藥也。

治婦人懷胎腹脹枳壳湯

枳壳三兩

黃芩兩

右為粗末。每服半兩。水一盞半。煎至一盞。去滓溫服。

治產前脹滿身體沉重。枳壳湯中加白木一兩。

治產前寒熱小柴胡湯中。去半夏。謂之黃龍湯。

治懷孕胎漏。二黃散。

生地黃

熟地黃各等分

右為細末。加白木枳壳湯調下。一兩日二服。

治有孕胎痛。地黃當歸湯。

當歸兩

熟地黃兩

右為粗末。作一服水三升。煎至升半。去滓頓服。

求胎丸

白木

枳壳去鐵炒各等分

右為細末。燒飯為丸。如桐子大。每月一日食前服。三五十丸。溫熟水下。胎瘦易生也。服至產則已。

產間藥



治胎衣不下或子死腹中或血衝上昏悶或血暴下及胞乾而不能產者宜服半夏湯

半夏一兩 桂枝七錢半 大黃五錢 桃仁三十個去

右為細末先服四物湯三兩服次服半夏湯三錢生薑三片水一盞煎去三分食後如未效次服下胎丸

下胎丸 生半夏 白斂各半

右二味為細末滴水為丸如桐子大食後用半夏湯下二三丸續漸加至五七丸如有未效者須廣大其藥榆白皮散主之又不效大聖散主之有宿熱入宜服人參荊芥散

產後藥

治產後經水適斷感於異症手足牽搐咬牙昏冒宜增損柴胡湯

柴胡八錢 黃芩四錢 人參三錢 半夏三錢 石膏四錢 知母二錢 黃耆五錢 甘草四錢

右為粗末每服半兩生薑五片棗四個水一盞半煎至一盞溫服清無時

前症已去次服秦芩湯去其風邪

秦芩八錢 人參三錢 防風四錢 芍藥兩半 柴胡八錢 黃芩四錢 半夏三錢 甘草四錢

右為粗末每服五七錢水一盞煎至七分溫服清無時二三日經水復行前症退宜服荊芥散小

柴胡小料中加荊芥穗五錢枳殼五錢麩炒去穢同小柴胡湯煎服二三日後宜正脾胃之氣兼除風邪宜服防風散

蒼朮四兩 防風三兩 當歸一兩半 羌活一兩半

右為粗末每服一二兩水三盞煎至一盞半取清絡續常服無時

凡胎前之藥無犯胎氣產後變化並同傷寒無症盡從加減四物湯

治產後腹大堅滿喘不能卧白聖散

樟柳根三兩 大戟一兩 甘遂二兩



右為極細末每服二三錢熱湯調下取大便秘利為度此藥主水氣之聖藥也

治產後風氣在表面目四肢浮腫宜加減局方中七聖丸每服二十九白湯下日加三四丸以利為度如浮腫喘嗽加木香檳榔倍之謂氣多浮則腫如頭目昏冒加羌活川芎謂多風也如只浮腫依七聖丸本方服之

治產後日久虛勞雖日久而脉浮疾者宜服三元湯

柴胡錢八 黃芩 人參 半夏洗 甘草各三錢 川芎 芍藥 當歸 熟地黄各二錢半

右為粗末同小柴胡湯煎服

治日久勞虛微有寒熱脉沉而浮宜柴胡四物湯

川芎 熟地黄 當歸 芍藥各一兩半 柴胡錢八 人參 黃芩 甘草 半夏各三錢

右為粗末同四物煎服

如日久虛勞鍼灸小藥俱不效者宜服三分散

白朮 茯苓 黃耆 川芎 芍藥 當歸 熟地黄各一兩

柴胡錢二 黃芩錢六 人參一兩 半夏錢六 甘草錢六

右為粗末每服一兩水一盞煎至半盞溫服清日一服

治產後虛勞不能食宜十全散

白朮 茯苓 黃耆各三兩 人參 川芎 芍藥 熟地黄各一兩

當歸一兩 肉桂半兩 甘草一兩

右剉如麻豆每服半兩水一盞半入生薑五片棗二枚同煎至七分空心食前溫服清

凡虛損病有深淺治有次第虛損論中詳論之

治產後諸風痿痺無力血風湯



秦光 羌活 防風 白芷 川芎 芍藥 當歸

地黃 白木 茯苓各等分

右為細末一半煉蜜為丸如桐子大一半為散溫酒調下九子五七十丸甚妙

治產後諸積不可攻當養陰去熱其病自退宜服芍藥湯

芍藥各一 黃芩 茯苓各六

右三味為粗末每服半兩水煎日三服去滓溫服

治產後兒腸大痛黑白散 烏金石燒紅醋上過 寒水石燒存性

右二味各等分另頻放臨服各取末一錢半粥飲湯下痛止便不可服未止再服大效

治產後不煩而渴桃花散 新石炭一兩 黃丹錢

右二味為細末臨渴時冷漿水調一錢服

治產後衝脹胸中有物伏是噎氣不降紫金丹 代赭石 礞石各等

右二味為細末醋糊為丸如桐子大每服三五十丸酒下胸中痛加當歸湯下久服治血癖

又方用代赭石兩 桃仁三錢 皮去 黃蘗共研末 薄荷水為丸如桐子大每服三五十丸溫水下無時

治臍腹痛不可忍四物湯一兩加玄胡三錢半

治血癖腹痛及血刺腰痛四物湯細末二兩加酒煮玄胡細末三兩每服三錢酒調下

治血運血結血聚於胸中或偏於小腹或連於肋脇四物湯四兩倍當歸川芎如鬼箭紅花玄胡各

一兩同為末加四物湯煎服取清調沒藥散服之

沒藥散 盲虫一錢 水蛭錢 麝香 沒藥三錢

右為細末煎前藥調服血下痛止即不可服只服前藥

治產後頭痛血虛痰癖寒厥皆令頭痛加減四物湯



羌活

川芎

防風

香附子炒

白芷各一

石膏半

熟地黃一兩

細辛二錢

當歸五錢

甘草五錢

蒼木二兩六錢

右為粗末每服一兩水煎服無時如有汗者是氣弱頭痛也方中加芍藥三兩肉桂一兩半加生薑煎如痰癖頭疼加半夏三兩茯苓一兩半加生薑煎如熱結頭痛加白芷三兩石膏三兩知母一兩半寒厥頭痛加天麻三兩附子一兩半加生薑煎

治產後風虛血眩精神昏昧荊芥散

荊芥穗三錢

桃仁五錢去皮尖炒

右為細末溫水調服三錢微喘加杏仁去皮尖炒甘草炒各三錢

川芎

治產前症胎不動如重物下墜腹冷如冰立効散

川芎

當歸各等分

右為粗末每服三錢水二盞煎至一盞去滓食前服

治婦人胎漏及因事下血枳壳湯

枳壳半兩

黃芩半兩

白朮一兩

右為粗末每服五七錢水一盞煎至七分食前空心服

治婦人筋骨痛及頭痛脉弦增寒如瘧宜服風六合

四物湯四兩加羌活防風各一兩

治婦人血氣上衝心腹肋下悶宜服治氣六合湯

四物四兩加木香檳榔各半兩

治婦人臍下冷腹痛腰脊痛宜服玄胡六合湯

四物內加玄胡苦練炒各一兩

治婦人氣充經脉月事頻併臍下痛宜服芍藥六合

四物內倍加芍藥

治婦人經事欲行臍腹絞痛宜服八物湯

四物內加玄胡苦練各二兩檳榔木香各半兩

治婦人經水過多別無餘症

四物內加黃芩白朮各一兩

治婦人經水澀少

四物內加葵花煎

治婦人虛勞氣弱喘嗽胸滿宜服氣六合

四物內製厚朴一兩炒枳實半兩

以上煎法並同四物服之



四物主治法

熟地黃 補血。如臍下痛非熟地黃不能除之。此通腎經之藥也。

川芎 治風瀉肝木如血虛頭痛非川芎不能除之。此通肝經之藥也。

芍藥和血理脾。治腹痛非芍藥不能除之。此通脾經之藥也。

當歸和血如血刺痛若刀刺狀非當歸不能除之。此通腎經之藥也。

以上四味治法如顯一症於四物湯中各加二味用之。如小腹痛四物湯四兩加玄胡苦練各一兩。

經水暴多四物四兩加黃芩一兩如腹痛者只加黃連如夏月用不去黃芩。經水如黑豆水加黃連。

黃芩各一兩如經水少而血色和者四物四兩加熟地黃當歸各一兩如經水通來適斷往來寒熱。

者先服小柴胡以去其寒熱後以四物湯調治之如寒熱不退勿服四物是謂變症表邪猶存不能。

效也。依前論中變症隨症用藥調治之。

治婦人血積增損四物湯。

四物內加廣茂京三稜桂乾漆皆依法製各加一兩如四物煎服。

治婦人產後血昏血崩月事不調遠年乾血氣皆治之各曰紅花散。

乾荷葉 牡丹皮 當歸 紅花 蒲黃

右各等分為細末每服半兩酒煎和滓溫服如依不效另和榆白皮煎湯調服半兩立效。

治婦人惡物不下 當歸 芫花 炒

右二味為細末酒調三錢又好墨醋碎末之小便酒調下妙。

又治胎衣不下蛇退皮二錢炒焦研細末酒調下。

諸見血無寒衄血下血吐血溺血皆屬於熱但血家症均宜服此生地黃散。

生地黃 熟地黃 枸杞子 地骨皮 天門冬 黃耆 芍藥 黃芩 甘草



右各等分同劉每服一兩水一盞半煎至一盞去滓溫服脉微身涼惡風每服一兩加肉桂半錢吐血者多有此說

治衄血不止麥門冬飲子

麥門冬

生地黃

右二味等分每服一兩煎服又衄血先硃砂蛤粉次木香黃連大便結下之大黃芒硝甘草生地黃瀉軟梔子黃芩黃連可選用

帶下論附

論曰赤者熱入小腸白者熱入大腸原其本也皆溫熱結於肺故津液湧溢是為赤白帶下本來病緣五脉經虛結熱屈滯於帶故女子臍下痛痛而綿綿陰器中時下也故經曰在脉為病男子內結七疝女子帶下瘕聚王注曰在臍自胞上過帶脉貫於臍上故男子內結七疝女子帶下帶脉起於季脇章門如束帶狀令濕熱鬱結不散故為病也結曰脾傳之腎病若曰瘕疝小腹鬱熱而痛出白一名曰蠱所以為帶下寃屈也寃結也屈滯而病熱不散先以十秦湯下之後服苦練丸大玄齒散調下之熱去濕除七自愈也如女子不月丸瀉心火血自下也內經曰二陽之病發心脾有不得隱曲故女子不月其傳為風消王注曰大可胃發病也心脾受之心主能心病則血不流脾主參其日則味不化味不化則精血不足精血不足故其症不能已虧則風邪勝而真氣愈消也又經曰月事不來者胞脉閉也胞脉屬於心而絡於胞中令氣上通肺氣不得上通故月事不來先服降心大之劑後服局方中五補丸後以衛生湯治脾補血氣也

苦練丸治婦人赤白帶下

苦練餅酒

茴香炒

當歸

右三味等分為細末酒糊為丸如桐子大每服三五十丸空心酒下如腰腿疼痛四物四兩加羌

活防風各一兩

衛生湯

當歸

白芍藥

黃耆

甘草



右為粗末每服半兩水二盞煎至一盞去滓空心溫服如虛者加人參一兩

### 大頭論第三十

夫大頭病者是陽明邪熱太甚。資實少陽相火而為之也。多在少陽。或在陽明。或傳太陽。視其腫勢。在何部分。隨經取之。濕熱為腫。木盛為痛。此邪見於頭。多在兩耳前後。先出皆主其病也。治之大不宜藥速。速則過其病。所謂上熱未除。中寒復生。必傷人命。此病是自外而之內者。是血病。況頭部分受邪。見於無形迹之部。當先緩而後急。先緩者。謂邪氣在上。着無形之分部。既着無形。無所不至。若用急劑速下。過其病難已。雖用緩藥。若急服之。或食前。或頓服。皆失緩體。則藥不能得除病。當徐徐浸漬。無形之邪也。或藥性味形體擬象。皆要不離緩體是也。且後急者。謂緩劑已瀉。邪氣入於中。是到陰部。染於有形質之所。若不速去。則損陰也。此終治却為客邪。當急去之。是治客以急也。且治主當緩者。謂陽邪在上。陰邪在下。各本家病也。若急治之。不能解紛。而益亂也。此故治主當緩。治客以急者。謂陽分受陰邪。陰分受陽邪。此客氣急。除去之也。假令少陽陽明為病。少陽為邪。出於耳之前後也。陽明為邪者。首大腫是也。先以黃芩黃連甘草湯。通炒過剉煎。少少不住服。或劑畢再用大黃。煨單粘子。新瓦上炒香。煎藥成去滓。內芒硝。俱各等分。亦時時呷之。無令飲食在前。得微利。反邪氣已。只服前藥。如不已。再同前次第服之。取大便利。邪氣即止。如陽明渴者。加石膏。少陽渴者。加瓜蒌根。陽明行經。升麻芍藥葛根甘草。太陽行經。羌活防風之類。

### 雷頭風附

夫治雷頭者。諸藥不效。為與症不相對也。蓋雷頭者。震卦主之。震仰盂。故余製藥。內加荷葉。謂象其震之形。其色又青。乃述類象形也。當煎局方中升麻湯。

升麻湯

蒼朮

荷葉一个全者

右為細末。每服五錢。水一盞煎至七分。食後溫服。或燒整荷葉一个。研細調煎。藥服亦妙。



耳論附

論曰耳者蓋非一也以竅言之是水也以聲言之金也以經言之手足少陽俱會其中也有從內不能聽者主也有從外不能入者經也有若蟬鳴者有若鐘聲者有若火熛熛狀者各隨經見之其間虛實不可不察也假令耳聾者腎也何謂治肺肺主聲鼻塞者肺也何謂治心心主鼻如推此法皆從受氣為始腎受氣於己心受氣於亥肝受氣於申肺受氣於寅脾正四季此法皆長生之道也

小兒癰疹論第三十一

論曰癰疹之病其狀各異瘡發焮腫於外屬少陽三焦相火也謂之癰小紅壓行皮膚之中不出者屬少陰君火也謂之疹凡顯癰症者若自吐瀉者慎勿治則多吉謂邪氣上下皆出也大凡瘡疹首尾皆不可下恐妄動而生變此謂少陽通表宜和之也當先安其裡以解毒次微發之安裡解毒者謂能安和五臟防風湯是也如大便不秘次微發之微發之藥錢氏書中甚多宜選用之如大便過秘宜微和之當歸丸粟變百祥丸是也初知是癰疹若便發之令癰疹得出恐小兒難禁是使別生他症也首尾不可下者首曰上焦尾曰下焦若已吐利不可下也宜用安裡藥三五服如能食而大便秘者是內實宜微疎利之若內虛而利者宜用安裡藥三五服末後一服調微發之藥服之大抵用安裡之藥必發表之藥少秘則微疏之邪氣不併出能作番次使小兒易禁也身溫者順身涼者逆宜服防風湯以和之

防風湯

防風

地骨皮

黃耆

芍藥

枳殼

荊芥穗

牛蒡子

各半

右為細和溫水調下

或為粗末煎服

二三錢

更妙

治大便秘而內實能食宜當歸丸

當歸

黃連

大黃

甘草

各一兩

右藥先將當歸熬膏次將三味研末入膏為丸漸次服十丸

治癰疹大便從結聚變百祥丸

大戟

去骨

棗肉

三個

去核



右二味用水一杯煎至水盡為度去大戟不用將棗焙乾可和劑服丸從少至多以利為度

五臟病各有所見證

熱則從心寒則從腎嗽而氣上則從肺風從肝瀉從脾假令瀉見嗽而氣上脾肺病也瀉白益黃散合而服之又宜黃芩厚朴湯白朮厚朴湯謂脾苦濕肺苦燥氣則上逆也其症先瀉又兼面色黃腸鳴嘔者是也如口渴熱多者當服黃芩厚朴湯不渴熱少者當服白朮厚朴湯其他五臟若有無症皆如此類然更詳後說四時綜核用藥

假令春分前風寒也宜用地黃羌活防風或地黃丸及瀉青丸相間服之春分後風熱也宜用羌活防風黃芩或瀉青丸用導赤散下之立夏後燥熱也宜三黃丸導赤散夏至後濕熱也宜導赤瀉黃散合而服之或黃芩甘草白朮茯苓之類為勝濕之藥立秋後宜用益黃瀉白散陳皮厚朴人參木香之類秋分後用瀉白散立冬後地黃丸主之謂腎不受瀉也大凡小兒蟲疹已發有瘡有聲音者乃形病氣不病也無瘡無聲音者乃氣病形不病也有瘡而無聲音者是形氣俱病也後一症當清利肺氣八風湯或涼血散大黃芒硝亦可或如聖湯加大黃或八味羌活湯加大黃此是春時發癰謂之風癰耳瘡疹者內經云痛痒瘡瘍皆屬心火癰子者是相君行命三焦真陽氣之所作也若氣入肺變膿胞入肝為水胞自病為癰心乃君火入於皮作癰疹為肺主皮毛心不害肺金此乃君之德也未瘡而發搖而外感寒邪內發心熱而發搖用茶湯下解毒丸或犀角地黃湯主之已發便稠密形勢如針頭者當輕發其表涼其內連翹升麻湯主之若癰已發稠密甚而微喘飲水有熱症當以去風藥微下之若出不快清便自調知為在表不在裡當微發之升麻葛根湯主之若有乾黑陷身不大熱大小便澀則知熱在內當煎大黃湯下宣風散身表大熱者表症未罷不可利大便若瘡疹已出見小熱小便不利者當利小便已發後有餘毒不散為復有身熱癰瘡之類當用解毒之藥

藥畧第三十二針法附



羌活 治支節痛太

桃仁 滋血破血

半夏 去痰

杏仁 潤肺除嗽

白朮 與蒼朮同

苦葶藶 瀉肺大

荊芥 清利頭目

梔子 除煩利氣

牛膝 補筋益脾

細辛 治少陰頭

乾薑 益氣和中

防風 祛風通用

黃芩 瀉肺氣

柴胡 治少陽陰

蒼朮 溫中去濕

陳皮 益氣

桔梗 治咽喉痛

烏梅 助脾胃

當歸 補三陰血

茯苓 益陽通

升麻 陽虛邪

生地黃 涼血

甘草 和中調

雄黃 去風

芍藥 治脾痛安

草烏 治熱行經

枳實 治心下痞

大黃 泄腸熱

沉香 益氣和神

川芎 治頭痛

蕪荖 補腎水

蛇蛻 去皮胃

沒藥 治血痛和血

肉桂 通陽助陽

白芷 治正陽明

人參 補氣和中

南星 治風痰

枳殼 治胸中氣

厚朴 治腹滿

肉豆蔻 治大腸

地黃 補腎水

破故紙 補命門

茴香 利便傳

苦練子 去小腸

桂枝 開汗和表

知母 泄腎大助陰

瓜蒌 治濕在上頭

天麻 治頭風

黃連 泄心火

黃耆 止汗治諸

附子 補命門

草薢 補腎不足

五味子 補五臟氣

大地榆 治下部

澤瀉 治少陰不渴而小便不利

麻黃 發太陽陰

石膏 治大陽

赤豆 利小便

神麴 消食強胃

白茯苓 治胃利小便

檳榔 破氣下行

芒硝 滅寒去燥

杜仲 壯腰

巴豆 去濕痰

廣茂 去皮骨

形色性味體

水大性溫味甘和  
木大性溫味甘和  
火大性熱味苦和  
土大性溫味甘和  
金大性寒味辛和

流注鍼法

心痛脉

脾痛

沉腎經原穴

弦肝經原穴

澀肺經原穴

浮心經原穴

緩脾經原穴

身之前足陽明原穴

身之後足太陽原穴

身之側足少陽原穴

身之側足少陽原穴

輕枯虛薄緩淺假宜上厚重實潤  
深真急宜下其中平者宜中餘形  
色性味體皆隨臟腑所宜此處方  
用藥之大藥耳知者若能用心則  
思過半矣



針之最要

兩脇痛。針少陽經。印墟。心痛。針少陽經。太谿。湧泉。及足厥陰。原穴。腰痛不可忍。針崑崙。及刺委  
中出血。太陽喘滿。痰實。口中如膠。針太谿穴。噦嘔無度。針手厥陰。太陵穴。頭痛不可忍。針足厥  
陰。太陽經原穴。熱無度。不可忍。刺陷骨穴。出血。骨熱不可治。前板齒乾燥。當灸骨夏。太推。小  
腸疝痛。當刺足厥陰。肝經太衝穴。血不止。鼻衄大小便皆血。血崩。當刺足太陰井。隱白。喉閉刺  
少陽手足井。并刺少商。及足太陰井。大煩熱。晝夜不息。刺十指間出血。謂之八關。大利。目疾。睛  
痛。欲出赤。大刺八關。百節疼痛。實無所知。三棱針。刺絕骨出血。  
眼大皆痛。刺手太陽井。冗少澤。小皆痛。刺少陽井。冗關衝。  
陰頭中痛。不可忍者。卒疝也。婦人陰中痛。皆刺足厥陰井。大敦。冗。



卷下

十六

術摩按兒小

小兒病最難治療以其口不能言脈無可切證無可問僅以望聞得之服藥又多不便亘古稱為啞科惟按摩術一法無須診脈亦不服藥祇要觀察五官神氣手紋洩便等如何便可依照書內按摩各法施治定能萬病回春諺云人之所患病多醫之所患道少醫者得此書而習之可免道少之憾推拏家得此正傳亦不致遺禍幼稚即在窮鄉僻壤小兒偶抱微疾一時延醫諸多不便即有醫而擬方矣則購藥或須至遠處者曠費時計不言可知設或不測徒呼天數視此委屈天喪良可閔也若得是書照法療治無不效驗如神著手成春誠保育小兒之鴻寶家當必備之秘笈也倘有能將此書購贈友朋實為惠福嬰孩功德無量也每部二冊定價八角


角五洋價定冊二治審經分草本

中 此書為蜀中羅茂亭上舍所著書  
西 中臟腑圖說辨析精詳兼列中西  
鑒 尤資互證所採各方簡要精當後  
粹 附張子培先生春溫三字訣唐容  
川先生痢症三字訣均時醫所必  
讀之書每部四冊定價六角

全生指迷 此書係宋名醫士王貽所著內容專論脈法甚為詳盡立方精微論理透澈久為醫家所推重此書本收入四庫提要向無單行本故欲購者甚難茲覓得家藏原本刊印流通書存無多購請從速

此書乃明王肯堂先生著原名醫鏡  
續問蔣氏刊行列入清四庫提要陸氏  
冷廬醫話言此書之難覓而此本又為  
康熙間名醫岳氏刪定改名醫鏡刪補  
歸安縣志載入藝文其稿未刻至光緒  
間江浦陳珠泉先生得其手稿重加校  
訂特更今名今特從陳君處借得付印  
圈點悉照原書條分縷晰淺顯易知不  
特學醫者所必備抑居家衛生之寶笈  
也每部四冊定價六角







L783L

1909

V. 4